

# 安胃美錠

## APO-CIMETIDINE TABLETS

200mg

衛署藥輸字第 019363 號

300mg

衛署藥輸字第 019364 號

400mg

衛署藥輸字第 019362 號

### 成分：

安胃美錠 200 公絲 圓形淡綠色膜衣錠，有一面刻著 APO 200 字樣，每錠含 Cimetidine 200mg  
安胃美錠 300 公絲 圓形淡綠色膜衣錠，有一面刻著 APO 300 字樣，每錠含 Cimetidine 300mg  
安胃美錠 400 公絲 蘋果形淡綠色膜衣錠，有一面刻著 APO 400 字樣，每錠含 Cimetidine 400mg

### 賦形劑：

Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Colloidal Silicon Dioxide, Hydroxypropyl Methylcellulose, D&C Yellow# 10 Aluminum Lake 14-18%, Ferric-Ferrous Oxide, Polyethylene Glycol 3350, Titanium Dioxide, Carnuba Wax, D&C Yellow, Ferric Ferrous Oxide, Purified water.

### 作用：

本劑是特殊的 H<sub>2</sub>-接受器抑制劑，可以有效抑制胃酸分泌。本劑是競爭性的抑制胃壁細胞上的 H<sub>2</sub>-接受器，特稱為 H<sub>2</sub>-接受器拮抗劑，本劑的治療效果是因為有效地抑制胃酸分泌而產生，口服或注射本劑，無論白天或夜晚都能抑制胃酸分泌。本劑可抑制食物組織胺、胰島素注射、咖啡因、胃泌素引起的胃酸分泌，但對於 carbachol 引起的胃酸分泌作用較小。抑制強度與劑量有關，血中濃度 0.25~5ug/ml 時 50%有抑制胃酸之現象。本劑可抑制胃酸的分泌量和酸度。本劑降低胃蛋白酶的分泌量和抑制胃酸分泌的量有關，和酸度的關係較小。本劑超過 400mg 與抗膽鹼素合用，不能明顯的增加抑制胃酸分泌作用。本劑不能改變胃排空情形及食道括約肌壓力；也不會影響胰液的分泌。口服本劑後迅速吸收生體可用率達 70%，血漿半衰期約 2 小時，24 小時內大部分排泄於尿液中。

### 適應症：

十二指腸潰瘍、胃潰瘍、消化性食道炎、上胃腸道糜爛或潰瘍引起之出血、再發性潰瘍、孔性潰瘍。

### 禁忌症：

目前尚未發現任何禁忌症。

### 注意事項：

1. 惡性胃腸腫瘤病患要先去除腫瘤，才能使用本劑治療胃潰瘍。
2. 腎功能不全病患要減量使用。
3. 孕婦、授乳婦要小心使用本劑。
4. 小孩使用應小心，劑量是 20 ~ 40mg/kg/day 分次使用。

### 交互作用：

1. 與 coumarin 類抗凝血劑合用延長凝血時間，所以本劑和此類藥物合用時必須監測及調整劑量。
2. 本劑會和粒腺體中的氧化酸 Cytochrome P450 結合，經此代謝的藥物會受本劑的干擾。
3. 與鎮靜劑、鎮痛劑、利尿劑、氣管擴張劑、毛地黃、propranolol 合用沒有明顯的交互作用。

### 副作用：

無嚴重的不良副作用，腹瀉，肌肉痛，暈眩，發紅，可逆性的意識不清，男性女乳症，發燒，肝炎，胰臟炎，血清中的 creatinine 和 transaminase 少量增加，白血球數減少，顆粒性白血球減少，全部血球減少，血小板減少。

### 過量及過量處理：

曾有服本劑 12 公克/日五天的報告，並無顯著的致病效應。處理方式就是將殘留在胃中的 APO-CIMETIDINE 儘速清除。動物試驗曾有過量報告。人工呼吸對動物很有助益。頻脈產生時可使用乙型封阻劑來控制。

### 用法用量：

本藥須由醫師處方使用。

1. 十二指腸潰瘍：300mg 每天四次或 200mg 每天三次，睡前治療 4-6 週，如果用胃鏡檢查傷口已癒合，改用 400mg 睡前一次，服用 6-12 週(預防復發)。
2. 胃潰瘍，食道回流：300mg 每天四次，至少治療 6 週至傷口癒合為止。
3. 上胃腸道出血：300mg 每 6 小時一次，視需要調整劑量，每天不得超過 2400mg。
4. 腎功能不全病患：200mg 或 300mg 每 12 小時給藥一次，視病情需要可縮短給藥間隔。
5. Zollinger Ellison 症：300mg 每天四次或 200mg 每天三次加睡前 400mg 一次，視病情調整劑量，每天不得超過 2400mg。

### 包裝：

200mg, 100 粒, 1000 粒塑膠瓶裝      300mg, 100 粒, 1000 粒塑膠瓶裝      400mg, 100 粒, 500 粒塑膠瓶

裝

製造廠：APOTEX INC. 150 Signet Drive, Toronto (Weston), Ontario, Canada M9L 1T9

藥商：鴻汶醫藥實業有限公司

台中市文心路三段 238 號 12 樓

電話：台北 02-27033813 台中 04-23175699

傳真：台北 02-27044862 台中 04-23176216

 APOTEX INC.  
CANADA'S PHARMACEUTICAL COMPANY