於懷孕和哺乳的婦女，但有迫切的理由時也可使用本品。
FDA Pregnancy Category（懷孕用藥級數）：C
孕期最初三個月與中間三個月：懷孕用藥等級 B
以動物探討生育毒性之研究結果並沒有證據顯示此藥品會危害胎兒，但目前尚無以懷孕婦女為對象之控制研究。
孕期最後三個月：懷孕用藥等級 D
此階段婦女不得使用 Naclof，因為有造成胎兒心室 Botalli 動脈導管過早閉合之危險，也可能使產痛受到抑制。哺乳婦女若口服 50 毫克劑量（10 瓶總劑量）應不至於使嬰兒產生任何不良反應，因為只有少量活性成分能進入母奶中。

【副作用】
臨床試驗發現投與本劑後會有下列不必要的反應出現：偶而輕微至中度短暫的刺痛和/或視力模糊。
極少出現癢、紅和畏光的過敏反應。

【交互作用】
尚未發現。本品可和類固醇的眼用製劑合用，若有必要，以臨床發現證實之。為避免有效成分被其他滴劑沖掉，使用兩種眼用滴劑應間隔至少 5 分鐘。

【過量】
意外食入本品，事實上不會有危險性，因為 5ml 的眼藥水只含 5mg 的 Diclofenac，相當於 3% 的大人最高口服推薦劑量，仍應避免誤食。

【不良反應】
傷口癒合延遲。
少數情況：噁心，嘔吐。
罕見情況：全身性過敏反應，例如氣喘、蕁麻疹、搔癢與急性鼻炎。
Naclof 之臨床研究曾經出現下列不適症狀：
滴用眼藥水後有時會產生輕微或中等程度之短暫刺痛感；同時，或者會單純出現視力模糊情形。
罕見情況：搔癢、發紅、對光線敏感等過敏反應，凹陷性角膜炎（keratitis punctata），手術後瞳孔放大。

【其他資訊】
使用眼藥水後請立刻拴緊瓶蓋。
開瓶後超過一個月期限則請勿使用。
請將本產品儲存於室溫下（15℃-25℃）。

【注意】
藥品請置於兒童拿取不到之處。

【包裝形式】
5 毫升滴瓶。

製造廠：Novartis Ophthalmics AG
廠　址：Riethofstraasse 1, CH-8442 Hettlingen, Switzerland
藥　商：台灣諾華股份有限公司
地　址：台北市仁愛路二段 99 號 11 樓
電　話：(02) 2341-6580

IPL issued: November 1993
TWI032106