

# 舒 利 便 膜 衣 錠

**SUKKUL BENPIYAKU** 衛署藥輸字第 020633 號

快適規則的排便可說是健康的氣壓表。所謂便秘可說是正常的排便習慣崩潰。慢性便秘不只是情緒不舒服，還會有腹部脹滿、皮膚粗糙、痔等的症狀相繼發生。

## 【特點】

1. 採用植物性有效成份而製成。
2. 服用量依年齡症狀做適量的配合。
3. 有便利於攜帶的 PTP 包裝於旅行出差時相當方便。
4. 本品是淡橙色的膜衣錠。

另外，同時請注意以下事項

## 【時常便秘的人】

1. 養成規則的排便習慣，每天定時至廁所，即使無便意亦然。
2. 多攝取（如蔬菜、水果、蒟蒻、洋粉、海藻等）高纖維食物，多喝水。
3. 用心去做適度運動，按摩腹部等。
4. 早上起床，先喝冷開水或牛乳等，容易形成便意。

## 【成份、份量】 Each Tablet Contains :

POWDERED RHUBARB (RHEI RHIZOMA) .....	100mg
POWDERED ALOE.....	18.75mg
SENNOSIDE.....	4.5mg

含 SUNSET YELLOWFCF 添加物

## 【用法、用量】

一日 2 次，於早晚空腹時（或隨餐）服用。成人 1 次 1~2 錠，12 歲以上適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，適用成人劑量之 1/2，初次應使用最小劑量，再視通便情況增減用量。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

## 【適應症】 緩解便秘

## 【包裝】 4~1000 粒 PTP 鋁箔盒裝

製造発売元



**佐藤藥品工業株式会社**  
奈良縣橿原市觀音寺町9番地の2  
SATO YAKUHIN KOGYO., LTD.  
9-2 KANNONJI-CHO, KASHIHARA-SHI  
NARA, JAPAN

藥 商：**德佑藥品有限公司**  
台北市敦化南路1段3號2樓

## 【注意事項】

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 五、瀉劑不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。除非有醫師藥師藥劑生指示，不得連續使用一星期以上，應儘量以含纖維飲食，充分攝取水分及運動來改善便秘。

## 【警語】

- 一、除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用瀉劑。
- 二、除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得使用。
- 三、內服製劑使用期間，若有噁心、嘔吐、嚴重腹痛或發疹過敏症狀時，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 四、若有血便及自發性腸道出血狀況，應立即停藥就醫。
- 五、使用一星期後無效者，應立即停藥就醫。
- 六、使用期間會有腹瀉發生，若腹瀉持續不止或加劇的情況下，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 七、除非有醫師藥師藥劑生指示，未滿 3 歲之嬰幼兒不得使用。  
(一)禁止用於胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心之患者。  
(二)長期使用會造成電解質不平衡與水分缺乏。
- 八、含 Senna 類成分：  
(一)Senna 類會使酸性尿呈黃、棕色，鹼性尿呈粉紅或紫紅色；且會使結腸黏膜變黑。  
(二)本藥含 Senna 類成分，若有皮膚紅、皮膚癢等過敏症狀時，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 九、大量使用含蘆薈之製劑，會引起骨盆腔內之臟器充血，孕婦、經期中婦女及腎炎、痔瘡之患者應留意。
- 十、本藥含大黃成分，若有皮膚紅、皮膚癢等過敏症狀時，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。