26X18cm

2019年1月改訂第四版

衛署藥輸字
第021806號

勝維達膠囊

SHIGMABITAN COMBINATION CAPSULES B25

醫師藥師藥劑生指示藥品

勝維達為Benfotiamine (BTMP)，Pyridoxine Hydrochloride (PIN)，Cyanocobalamin (CN VB12) 三者配合，是維他命B 製劑。

成分	說明
維他命B1 (Benfotiamine)：	缺乏維他命B1，易引起神經系統之症狀，如：神經炎、手腳灼痛及麻木、肌肉無力、小腿痙攣、腳氣病
維他命B6 (Pyridoxine)：	缺乏維他命B6，易引起手腳灼痛及麻木，末梢及皮膚感覺異常(不適)
維他命B12 (Cobalamin)：	缺乏維他命B12，易引起周圍神經病變和視神經病變

【主成份】：(為紅色及黃色不透明硬膠囊，每粒膠囊含)

Benfotiamine	**34.58mg**
Pyridoxine Hydrochloride	**25mg**
Cyanocobalamin	**0.25mg**

賦形劑 Lactose Hydrate，Mircrocrystalline Cellulose，Magnesium Stearate

本膠囊含添加物Erythrosine，Sunset Yellow FCF，Brilliant Blue FCF，Titanium Oxide

【適應症】：維他命B1、B6、B12 缺乏症。

【使用上注意事項】：

- 有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  (1)65歲以上，而且身體虛弱的人。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  (1)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  (2)5歲以下。
  (3)患有肝腎疾病、心臟病、其他過敏或重大疾病的人。
  (4)曾因其他藥品引起過敏的人。
  (5)併服其他藥品、維生素、礦物質製劑或營養補充品。
- 其他使用上注意事項：
  (1)為防止兒童誤食請妥善保管。
  (2)避免陽光直射並存放於濕氣較少之陰涼處。
  (3)勿超過建議使用量。
  (4)不得併服含酒精飲料。
  (5)請勿服用過期的本製品。
  (6)避免誤用及保證品質，請勿裝入其他容器內。

【用法用量】：

通常成人一日3~4錠，經口服使用	依年齡症狀適宜增減，若無效，勿連續數月服用

【警語】：

- 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	紅疹、搔癢感
腸胃道	食慾不振、胃部不快感、噁心嘔吐、腹瀉

- 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
  1. 若有上述外之其他不適情況產生。
  2. 連續服用本藥數月後，若症狀沒有改善。

【包裝】：8～1000 粒PTP盒裝。 **【儲存條件】**：請於室溫25° C以下遮光儲存。

藥商：
秉新藥業股份有限公司
台北市忠孝東路5段429號4F

經銷商：
凌統藥品有限公司
高雄市前鎮區桂林街112巷63號

製造廠名稱：東和藥品株式會社 Towa Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司地址：日本大阪府門真市新橋町2番11號 2-11, Shinbashicho, Kadoma-shi, Osaka-fu 571-0048, Japan
製造廠地址：34-2, Taiheidai, Shoo-cho, Katsuta-gun, Okayama, Japan

DIC85 SOGO
DIC196 SOGO
BK SOGO
AC SOGO
gaikei SOGO

東和薬品

開封口

A73
A73
A73
A73
A73

100カプセル

シグマビタン®
配合カプセルB25

（ベンフォチアミン・ピリドキシン塩酸塩・
シアノコバラミン配合カプセル）

B25

東和薬品

M 55×45×99.5(外) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

B25

勝維達膠囊
醫師藥師藥劑生指示用藥
衛署藥輸字第021806號

有效成分及含量、其他成分：
Benfotiamine 34.58mg (As Thiamine Hydrochloride 25mg), Pyridoxine Hydrochloride 25mg, Cyanocobalamin 0.25mg, 賦形劑：Lactose Hydrate, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate
其他成分：本膠囊含添加物Erythrosine, Sunset Yellow FCF, Brilliant Blue FCF, Titanium Oxide
用途：維他命B1、B6、B12缺乏症
不得使用族群：曾因本藥成分引起過敏者。
用法用量：通常成人一日3~4錠，經口服使用，依年齡症狀適宜增減，若無效，勿連續數月服用。
類別：醫師藥師藥劑生指示用藥
諮詢專線：0800-513-148

進口商名稱：東新藥業股份有限公司
地址：台北市信義區忠孝東路5段429號4樓
製造廠名稱：Towa Pharmaceutical Co.,Ltd
製造廠地址：34-2, Taiheidai, Shoo-cho, Katsuta-gun, Okayama, Japan
批號：詳見外盒
有效期限：詳見外盒

155225070600

B25

H-6 J

B25

使用期限
(Exp.)
製造番号
(Lot)

GS1

シグマビタン®
配合カプセルB25
100カプセル(10カプセル×10)

紙

B25

55×45×100

開封済

100カプセル(10カプセル×10)

シグマビタン®
配合カプセルB25
神経痛、筋肉痛
本剤に含まれるビタミン類の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合

（ベンフォチアミン・ピリドキシン塩酸塩・
シアノコバラミン配合カプセル）

B25

100カプセル

シグマビタン®
配合カプセルB25

（ベンフォチアミン・ピリドキシン塩酸塩・
シアノコバラミン配合カプセル）

B25

東和薬品

B25

100Cap.(10Cap.×10)
シグマビタン®配合カプセルB25
SHIGMABITAN® COMBINATION CAPSULES B25
34.58 mg of benfotiamine (25 mg as thiamine chloride hydrochloride) / capsule
25 mg of pyridoxine hydrochloride / capsule
0.25 mg of cyanocobalamin / capsule
Activator for Neural and Muscle Function

B25

製造販売元
東和薬品株式会社
大阪府門真市新橋町2番11号

TOWA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
2-11,SHINBASHI-CHO,KADOMA,OSAKA/JAPAN

B25

1校	制作日	2014.07.10	改訂日		寸 法	H229×W214	⚠ 特記事項
編 集	データ検版	紙面比較検査	目視検査	承 認		営業部門	ITF 100% 細エレメント 0.211 エレメント比 2.5
辻							相互印刷紙器株式会社

1校	制作日	2014.07.10	改訂日		寸 法	H229×W214
編 集	データ検版	紙面比較検査	目視検査	承 認		営業部門
辻						

⚠ 特記事項
ITF 100%
細エレメント 0.211
エレメント比 2.5

相互印刷紙器株式会社

M 55×45×99.5(外) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

A73 A73 A73 A73 A73

1552250700600

勝維達膠囊

醫師藥師藥劑生指示用藥
衛署藥輸字第021806號

進口商名稱：東新藥業股份有限公司
地址：台北市信義區忠孝東路5段429號４樓
製造廠名稱：Towa Pharmaceutical Co.,Ltd
製造廠地址：34-2, Taiheidai, Shoo-cho, Katsuta-gun, Okayama, Japan
批號：詳見外盒
有效期限：詳見外盒
經銷商：凌統藥品有限公司
地址：高雄市前鎮區桂林街112巷63號
電話：07-3308892

有效成分及含量、其他成分：
Benfotiamine 34.58mg (As Thiamine Hydrochloride 25mg), Pyridoxine Hydrochloride 25mg, Cyanocobalamin 0.25mg, 賦形劑: Lactose Hydrate, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate
其他成分：本膠囊含添加物Erythrosine, Sunset Yellow FCF, Brilliant Blue FCF, Titanium Oxide
用途：維他命B1、B6、B12缺乏症
不得使用族群：曾因本藥成分引起過敏者。
用法用量：通常成人一日3～4錠，經口服使用，依年齡症狀適宜增減，若無效，勿連續數月服用。
類別：醫師藥師藥劑生指示用藥
諮詢專線：0800-513-148

薬品級B群

東和薬品

100カプセル

シグマビタン®

（ベンフォチアミン・ピリドキシン塩酸塩・シアノコバラミン配合カプセル）

開封口

東和薬品

55×45×100

シグマビタン®

100カプセル（10カプセル×10）

使用期限 (Exp.)
製造番号 (Lot)

GS1

100カプセル

シグマビタン®

（ベンフォチアミン・ピリドキシン塩酸塩・シアノコバラミン配合カプセル）

東和薬品

100カプセル（10カプセル×10）

シグマビタン®

EX

100カプセル

薬品級B群

B_1 B_6 B_{12}

神経痛
肌肉痛

本剤に含まれるビタミン類の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合

開封済

東和薬品株式会社

100Cap.（10Cap.×10）

シグマビタン®

SHIGMABITAN COMBINATION CAPSULES B25

34.58 mg of benfotiamine (25 mg as thiamine chloride hydrochloride) / capsule
25 mg of pyridoxine hydrochloride / capsule
0.25 mg of cyanocobalamin / capsule

Activator for Neural and Muscle Function

製造販売元
東和薬品株式会社
大阪府門真市新橋町2番11号

TOWA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
2-11,SHINBASHI-CHO,KADOMA,OSAKA/JAPAN

DIC85	DIC196	BK	AC	gaikei
S060	S060	S060	S060	S060