

## 警語和注意事項

糖尿病病患：每毫升相當於 0.04 單位麵包。

感染或惡性腫瘤引起的貧血病患：外來替代的鐵會被儲存於網狀內皮系統，只有當原發性疾病痊癒後鐵才會被代謝利用。

交互作用

至今尚未有交互作用報告。因為富鐵好溶液的鐵是複合物，所以不會和食物中的組成(植酸鹽、草酸鹽、鞣酸等)及併藥劑(四環黴素、制酸劑)發生離子性交互作用。

檢驗是否有潛血反應的潛血試驗(對血紅素有專一性)，服用富鐵好溶液並不會造成影響，因此不需要中斷鐵劑治療。

懷孕和哺乳

動物的生殖試驗未發現對胎兒有害。針對懷孕第一期後婦女進行控制試驗，也未發現任何對母體和胎兒之不良反應。無證據顯示對懷孕第一期會造成危險而且對胎兒也無負面影響。服用富鐵好溶液對正在接受哺乳的兒童殆無不良影響。

在懷孕和哺乳期間，服用富鐵好溶液前須先徵詢過醫師或藥師之同意。

不良反應

服用富鐵好滴劑後副作用發生率極低，可能的副作用：便秘、下痢、噁心、腹部疼痛、胃部不適、消化不良、嘔吐、皮疹(蕁麻疹、疹、搔癢)。

排黑便是鐵排除所造成的正常現象。富鐵好滴劑不會著色於牙齒。

過量

至目前為止尚未有中毒或鐵過度負荷的案例。

儲存

25°C以下保存於原容器。

包裝

150 毫升瓶裝，以防破壞螺旋紋蓋密封，並附有量杯。

製造廠：

Vifor S A

Route de Moncor 10 CH-1752 Villars-Sur-Glane, Switzerland

基商

弘加洋生技股份有限公司

臺北市中山區南京東路二段 88 號 10F

昌黎縣中學