睛晶　點眼液

MARINE EYE GOLD

眼睛紅 • 眼睛癢

衛署藥輸字第 023145 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

近年來因為花粉、室內塵埃、空氣污染等原因所造成的過敏性眼睛疾患者不斷增加。這些過敏症狀造成眼睛發癢，此外還會有結膜充血、流淚及流鼻水等不舒服的情況。**睛晶點眼液**可以緩解眼睛發癢，及緩和種種不適的症狀。

■ 有效成分及含量(1ml 中)

Naphazoline Hydrochloride.....**0.03 mg**
Chlorpheniramine Maleate .....**0.30 mg**
Dipotassium Glycyrrhizinate .....**2.00 mg**
其他成分(賦形劑): Dibasic Sodium Phosphate Hydrate, Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate, Sodium Chloride, Glycerin, Chlorobutanol, Ethyl Parahydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, l-Menthol, d-Borneol, Purified Water.

■ 用途(適應症)

暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適或眼睛紅。

■ 使用上注意事項

一、有下列情形者，請勿使用:
　曾因本藥成分引起過敏的人。。
二、 有下列情形者，使用前請先洽醫師診治:
　正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人
三、 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生:
　青光眼的人
四、 其他使用上注意事項
　(一)為防止兒童誤食請妥善保管。
　(二)避免陽光直射。
　(三)使用前，請洗淨雙手
　(四)請依照藥品標示使用。
　(五)以下情形，請勿繼續使用：
　　1、超過保存期限的眼藥水。
　　2、藥液混濁、變色或出現異物時。
　　3、開瓶 28 天後。
　(六)為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口， 並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。
　(七)如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：
　　1、使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔 10 分鐘以上再用藥膏。
　　2、使用兩種眼藥水時，建議間隔 5 分鐘以上。
　(八)配戴隱形眼鏡時，請勿使用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水。
　(九)過度使用會增加眼睛紅腫。
　(十)請勿作為軟性隱形眼鏡之裝著液，配戴時也請勿使用。
　(十一)本藥為點眼用藥，點眼以外之目的請勿使用。
　(十二)不用時請蓋緊瓶蓋。

■ 用法用量

一般眼用製劑：

一天 3 至 4 次	每次 1 至 2 滴

■ 警語

一、 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副　做　用
皮膚	皮膚發疹、發紅，皮膚癢
眼睛	眼睛充血，眼睛癢，眼睛乾燥

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治:
　(一)連續使用三天症狀沒有改善
　(二)使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
　(三)若有任何不適情況產生。

■ 包裝 : 15ml 塑膠瓶裝

■ 儲存溫度: 25° 以下

製造廠　***Saga pharmaceutical Company Ltd.***
481 Kokura Oaza Kiyama-Machi Miyaki-Gun Sagaken Japan
進口商　**德惠藥品有限公司**
高雄市苓雅區武廟路 107 號 12 樓之 1　電話: 07-7235604