新鮮視 洗・眼・液

醫師藥師藥劑生指示藥品
衛署藥輸字第023229號
Fresh-Eye(Eyewash)

◆ 用於眼睛有不舒服感覺時的清洗，以清涼、輕鬆的方式預防眼病
◆ 因灰塵與髒污造成的眼睛異物感，清洗眼睛癢等不舒服感覺，使其清爽舒暢

眼睛不舒服時，可洗淨眼睛

◆ 起床時眼睛感覺乾澀
◆ 不想以手揉擦去除眼屎
◆ 在泳池游泳後眼睛疼痛
◆ 清除進入眼中的灰塵與不潔物
◆ 洗眼時不想以自來水清洗

●成分

有效成分及含量，每100mL中含：

ε-Aminocaproic Acid 200mg
Chlorpheniramine Maleate 3mg
Glycyrrhizinate Dipotassium 20mg
Chondroitin Sulfate Sodium 5mg

其他成分(賦形劑)
Boric Acid、Sodium Borate、Disodium Edetate Hydrate、Polysorbate 80、Benzalkonium Chloride、l-Menthol、d-Borneol、Sodium Hydroxide、Hydrochloric Acid、Purified Water。

●用途(適應症)

沖洗眼部。

⚠使用上注意事項

(一) 有下列情形者請勿使用：
1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
(二) 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
1. 正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。
(三) 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生:
1. 兩歲以下
(四) 其他使用上注意事項：
1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，請儲存於25℃以下。
3. 使用前，請洗淨雙手。
4. 請依照藥品標示使用。
5. 以下情形，請勿繼續使用。
(1) 超過保存期限的眼藥水。
(2) 開瓶28天後。
(3) 藥液混濁、變色或出現異物時。
6. 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。
7. 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效:
(1) 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔10分鐘以上再用藥膏。
(2) 使用兩種眼藥水時，建議間隔5分鐘以上。
8. 配戴隱形眼鏡時，請勿使用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水。
9. 請勿當作隱形眼鏡的裝著液，以及戴有隱形眼鏡的情況下請勿使用。
10. 本藥品僅供洗眼用。
11. 單眼洗過後的藥液，請勿再洗另一個眼睛。
12. 孩童請在大人的監督指導下使用。

●用法用量

用　法	用　量
一天3至6次	每次5mL

(一)每次使用前，將洗眼用杯快速以水濕潤，避免污染洗眼用杯的杯緣與杯內面。將杯子裝一次使用量且拿近欲處理的眼部，壓緊以免液體流出，將頭稍向後仰，打開眼瞼且轉動眼球使洗眼液能夠充分清洗到眼部，在使用後用乾淨的水洗淨杯子。
(二)隱形眼鏡配戴的情況下，使用前請將隱形眼鏡卸下。
(三)使用前，請先將眼睛周圍的化粧品及髒污擦拭乾淨。


⊘警語

使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
1.連續使用三天症狀沒有改善。
2.使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
3.若有任何不適情況產生。

●包裝

500公撮(毫升)以下塑膠瓶裝附量器。

●洗眼法



1 以內附之洗眼杯倒入5mL（至杯內側的線）。



2 瞼朝下，請對準眼睛緊壓。



3 接下來，杯蓋覆於眼睛上，溶液不外溢的情況下將頭後仰，面朝上。反覆眨眼數回清洗。



4 將眼液丟棄，洗眼杯洗淨，另一隻眼以相同方式清洗。



注意事項

若必要時要避免眼液外流，在洗眼時可將頭微向內側傾斜，即洗右眼頭向左傾，洗左眼頭向右傾。

製造廠 nitto medic co.,ltd
1-14-1 Yasuuchi,
Yatsuo-Machi, Toyama-City, Toyama
939-2366, Japan

發売元 TOA TOA Medicine Co., Ltd.
26, Sango, Toyama-city, Toyama-ken, 939-3548, Japan

藥商 大法貿易股份有限公司
台北市忠孝東路四段107號8樓-1
(02)2763-7101