免糖康膜衣錠 500 毫克
Meglucon 500 Film-Corated Tablets

SANDOZ
a Novartis company

衛署藥輸字第 023559 號

本藥須由醫師處方使用

處方成分：
主成分：每錠含 Metformin Hydrochloride 500mg。
賦形劑：Povidone K-90, Magnesium Stearate, Hypromellose, Titanium Dioxide, Macrogol 4000。

適應症：
糖尿病。

用法用量：
(1) Metformin 之每日最大劑量為速效劑型：3000mg；緩釋劑型：2000mg。(2)80 歲以上老年病人不建議開始使用 Metformin 治療。(3) Metformin 用於治療 80 歲以下之老年患者時，應特別謹慎。(4) 腎絲球體過濾率 (eGFR) 介於 30-45 ml/min/1.73m^2 應減量使用。

警語：
Metformin 有導致代謝性酸中毒（例如：乳酸中毒）之風險，醫療人員宜提醒病患該不良反應，倘若出現代謝性酸中毒之不良反應，應立即停藥並回診開立處方之醫師。

使用禁忌：
腎絲球體過濾率 (eGFR) 小於 30ml/min/1.73m^2 禁用。
對本品主成分或其他成分過敏者、糖尿病昏迷、酮酸中毒、嚴重腎功能損傷、慢性肝病、心臟衰竭、心肌梗塞、酒精中毒、伴有組織血氧過少與乳酸中毒有關的休克或肺機能不全等症狀，有嚴重之感染疾病者，有乳酸中毒的病史者均禁用該藥品。與 Sulphonylurea 或與 Insulin 併用於控制糖尿病時有產生低血糖症之可能，需檢查血糖值。
懷孕或哺乳期婦女禁止使用（雖然無臨床相關致畸形兒之報告）。
Metformin 使用於高齡之糖尿病病患時，應監測其腎臟及肝臟功能，避免有乳酸沉積中毒之危險性。

用法用量之注意事項：
(1) 靜脈注射顯影劑有導致急性腎功能下降之危險，因此醫師為病患注射顯影劑應先停用 Metformin，且需確認病患術後之腎功能恢復正常，才能再開始使用該藥品。
(2) 醫師為病患處方 Metformin 時，需定期監測其腎功能。
1. 開始用量 500mg 每天 3 錠，必要時可增加劑量至 3g，一般約服用幾天即可控制，有時需要到二個星期，當病情控制後即應減少劑量。
2. 當使用 Sulphonylurea 治療而無法獲得適當之血糖控制時可併用 Metformin 500mg 一錠，用量可逐漸增加到獲得最適當之控制。通常 Sulphonylurea 之用量可減少，甚至停用，而用 Metformin 做為單獨之治療。
3. 當與 Insulin 併用時。
   (1) 當與 Insulin 之用量每天低於 60 單位時，起初 Metformin 一錠，接著 Insulin 之用量（每 2-4 天 4 單位）可逐漸減少，Metformin 每隔一星期增加劑量。
   (2) 當 Insulin 之用量每天超過 60 單位時，Metformin 之加入時會促使血糖值急速下降，故服用 Metformin 後之 24 小時，得謹慎觀察病情，而後用 (1) 之方法。
4. 腎功能不良時得留意，孕婦不得使用（雖然沒有發生畸形兒之報告），又因感染、外傷、手術等引起之脫水現象發生，這亦是暫時性之代償功能衰敗，病患長期服用 Metformin 治療得每年檢查血清中 B12 評估值，如與 Sulfonylurea 或 Insulin 併用可能引起低血糖症，故對糖尿病之控制需注意血糖值，使用 Meformin 與 Insulin 治療時，需遵從醫師指示視病情調整劑量。

交互作用：
當 Metformin 與下列藥品併用時，可能會增強其降血糖之效果而產生血糖過低之現象：Insulin，其他口服降血糖藥（如 Sulphonylureas, Acarbose），NSAID（Salicylates 及 Pyrazolones），MAO Inhibitors, Oxytetracycline, ACE Inhibitors, Fibrates, Cyclophosphamide or its derivatives， 長期服用 Beta-receptor blockers 及 Antisympathotonics（ 如 Clonidine, Reserpine, Guanethidine）將導致血糖濃度降低，增強 Metformin 降血糖之效果。
併用 Cimetidine 會延長本品作用，可能增加乳酸中毒之危險。
當 Metformin 與下列藥品併用時，可能會降低其降血糖之效果：Glucocorticoids, Oestogen-gestagen combinations, Adrenaline and Other Sympathomimetics, Glucagon, Thyroid hormones, Thiazides and loop diuretics, Diazoxide, Phenothiazines and derivatives of nicotinic acid, Guar, Cholestyramine 等會降低 Metformin 之吸收而降低其療效。
最近已有 Metformin 與某些抗凝血劑間有產生相互作用之報告，故抗凝血劑之使用需作調整。
服用 Metformin 時，應避免飲酒。

使用過量：
具胃腸不適、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀。

服用過量之處理：
若因服用過量之 Metformin 而產生乳酸中毒之現象，應藉由血液透析之方法去除血中過多之乳酸。

副作用：
極少數患者服用 Metformin 有皮膚過敏、頭痛、倦怠感，嚴重甚至因低血糖導致昏迷等症狀。有輕微、短暫性腸胃不適，這一點可由 Metformin 於用餐時服用而避免之，或者可由暫時性之減量而得改善，只有 3% 患者得停用 Metformin 治療，因此當有不良忍受性初發生時，不可馬上撤消使用 Metformin 治療，這一點很重要。通常糖尿病受控制後腸胃不適之現象可消失而不必改換。
少數之乳酸中毒之病例有所報告，這時 Metformin 之使用將是禁忌。

儲存：
本品請置於孩童伸手不及之處。

包裝：
6-1000 粒膜衣錠，鋁箔盒裝。

製造廠：LEK S.A.
廠　址：U1, Podlipie 16, 95-010 Strykow, Poland
包裝廠：LEK S.A.
廠　址：50C Domaniewska Str., 02-672 Warsaw, Poland
藥　商：台灣諾華股份有限公司
地　址：台北市仁愛路二段 99 號 11、12、13 樓
電　話：(02)2341-6580

TWI-160215