麗眼舒 ™ 單支裝點眼液 0.5%

Refresh Plus ™ Lubricant Eye Drops

衛署藥輸字第 023834 號

麗眼舒 ™ 單支裝點眼液 0.5%，可暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。本品不含防腐劑，可免去因防腐劑成分可能帶給您眼睛的刺激感。需要時可以使用本品，緩解眼睛之乾澀。

【成分】有效成分及含量：每 mL 含 Sodium Carboxymethylcellulose 5 mg

其他成分(賦形劑)：Sodium chloride, sodium lactate, potassium chloride, calcium chloride dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, sodium hydroxide, hydrochloric acid, purified water.

【用途(適應症)】：暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。亦可暫時緩解因配戴隱形眼鏡造成之不適。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：對本藥之有效成分或其他賦形劑過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。
- 其他使用上注意事項：

(一)為防止兒童誤食請妥善保管。
(二)避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
(三)使用前，請洗淨雙手。
(四)請依照藥品標示使用。
(五)以下情形，請勿繼續使用：
1. 過期眼藥水。
2. 藥液混濁、變色或出現異物時。
3. 可回蓋式(re-cap)不含防腐劑拋棄式小包裝眼藥水，請於24小時內使用完畢，未使用完之溶液請勿繼續使用。
4. 本藥外觀包裝有破損時。

(六)為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用， 或以其他容器承裝。
(七)使用兩種眼藥水時，請隔開至少5分鐘後點藥。
(八)使用兩種眼藥時，請先使用藥水再用藥膏；並請隔開至少10分鐘後點藥。
(九)使用本藥後可能出現短暫視力模糊的現象，而影響駕車或操作機械的能力。病人應等視力恢復清晰後再行駕車或操作機械。
(十)下列副作用為本藥上市後自發性通報，無法確定其人數及發生頻率：
視覺異常：眼睛分泌物、眼睛痛、眼睛癢、眼瞼邊緣結痂及/或藥物殘留、眼睛有異物感、眼部充血、視力模糊及/或視覺障礙
免疫系統異常：過敏包括眼睛腫脹的過敏症狀或眼瞼水腫
中毒與醫療傷害：眼睛表面損傷(點藥時瓶口碰觸到眼睛)及/或角膜損害

【用法用量】

需要時使用	每次 1 至 2 滴

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【警語】
一、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
(一) 連續使用三天(或 72 小時)症狀未解除。
(二) 使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
(三) 若有任何不適情況產生。
(四) 發生過敏反應。

儲存溫度：攝氏 15-25°C
製造廠：Allergan Pharmaceuticals Ireland
製造廠址：Castlebar Road, Westport, County Mayo, Ireland

修訂日期:2018 年 5 月

藥商名稱：
台灣愛力根藥品股份有限公司
地址：台北市中正區羅斯福路二段 102 號 9 樓

© 2018 Allergan. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.