

15

50

50

50

49

17.5

49


90

205.5

49

ZZ90-2801T

0021-9195



## 胃養健膠囊

注意


1. 次の人は服用しないこと。  
(1) 透析療法を受けている人。  
(2) 本剤又は本剤の成分によるアレルギー一症状を起こしたことがある人。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 服用に際しては、説明書をよく読むこと。
4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

保存期限 LOT.

衛署薬輸字第023853號

藥商  
德佑藥品有限公司  
台北市敦化南路一段3號2樓  
www.dokuyu.com.tw

製造販売元  
至誠堂製薬株式会社  
SHISEIDO PHARMACEUTICAL INC.  
日本奈良県御所市茅原220-1  
220-1, Chihara, Oaza, Gose-city, Nara, Japan



## 総合胃腸薬

胃痛・胃もたれ・消化不良

マックローム® ED

60cap.

第2類医薬品

第2類医薬品

## 総合胃腸薬

胃痛・二日酔のおかつき・消化不良

マックローム® ED

至誠堂製薬株式会社



【有効成分及含量】一日量(6粒)中:

有効成分	含量
Sodium Bicarbonate	300mg
Magnesium Carbonate	600mg
Magnesium Aluminometasilicate	800mg
Scopolia Extract(東莨菪萃取)	30mg
Biodiastase(消化酵素)	350mg
Ursodeoxycholic Acid	20mg

其他成分(賦形剤): Carmellose Calcium, Microcrystalline Cellulose, Lactose Hydrate, Potato Starch, Tartrazine, Erythrosine, Titanium Oxide

【用途(適應症)】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多、幫助消化

【不得使用族群】

- ① 曾因本藥成分引起過敏的人
- ② 哺乳婦請勿服用本藥，若服用本藥時請避免哺乳

【用法・用量】

年齢	使用量	使用次數
成人及12歳以上	1次 2粒	1日3次
6歳以上未滿12歳	1次 1粒	或需要時服用

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品

【諮詢專線】 0800-020-788

請詳閱說明書後使用

版No.3



4 934911 200210

五校	18.2.22	營業	大源	品名	マックロームED 60CAP(瓶)ケース				
受注番号	1481-17-0502	制作	島津	刷色					
商品ID	0021-9195	校正	畑	色名	K	M	C	Y	スポットニス

製版一校		
製版	—	担当課長
色校	—	本機

13.8

68

45

68

44.2

φ

φ

0052-1550



西薬(含生薬成分)

第2類医薬品

72cap.

胃養健膠嚢

胃痛・宿酔造成的脹氣・消化不良

マツクローム® ED

至誠堂製薬株式会社



000000.0000000

保存期限 LOT.

0000.00-00000



胃痛・宿酔造成的脹氣・消化不良

マツクローム® ED

第2類医薬品

胃痛・二日酔のむかつき・消化不良

マツクローム® ED

第2類医薬品

総合胃腸薬

胃痛・二日酔のむかつき・消化不良

マツクローム® ED

第2類医薬品

【有効成分及含量】一日量(6粒)中：

含量	有効成分
300mg	Sodium Bicarbonate
600mg	Magnesium Carbonate
800mg	Magnesium Aluminumsilicate
30mg	Scopolia Extract(東馬毒萃取)
350mg	Biodiastase(消化酵素)
20mg	Ursodeoxycholic Acid

其他成分(賦形劑)：

Carboxymethyl Cellulose, Lactose Hydrate, Potato Starch, Tartrazine, Ery-

throsine, Titanium Oxide

【用途(適應症)】緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所隨之胃酸過多、幫助消化

【不得用族群】

①曾因本藥成分引起過敏的人

②哺乳婦女勿服用本藥，若服用本藥時請避免哺乳

使用量	年齡	使用次數
1日3次	成人及12歲以上	1次2粒
或需要時服用	6歲以上未滿12歲	1次1粒

【用法・用量】

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

請詳閱說明書後使用

衛署藥輸字第023853號

藥商 德佑藥品有限公司

台北市敦化南路一段3號2樓

www.dokuyu.com.tw

製造販売元 至誠堂製薬株式会社

SHISEIDO PHARMACEUTICAL INC.

日本奈良県御所市茅原220-1

Nara, Japan



三校	18.2.22	営業	大源	品名	マツクロームED 72錠ケース
要注	1481-17-0501	制作	島津	副色	
製考		校正	畑	色名	K
商品ID	0052-1550				M
					C
					Y

製版一校	製版	包袋
—	—	—
—	—	—
—	—	—


72cap.

# マックローム® ED Machrome Capsules

72cap.

西藥(含生藥成分)

# マックローム® ED Machrome Capsules



胃痛・二日酔の  
むかつき・消化不良  
マックローム® ED


至誠堂製藥株式会社



72cap.

医薬品

# 胃養健膠囊 Machrome Capsules



胃痛・宿酔造成的脹氣・消化不良

マックローム® ED

至誠堂製藥株式会社

## マックローム® ED

注意

- 次の人は服用しないこと。  
(1)透析療法を受けている人。  
(2)本剤又は本剤の成分によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 服用に際しては、説明書をよく読むこと。
- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

保存期限 LOT.



衛署藥輸字第023853號

藥商 德佑藥品有限公司  
台北市南京西路46號5樓  
www.dokuyu.com.tw

經銷商：弘鑑貿易股份有限公司  
台北市敦化南路一段190巷45號7樓  
製造販売元 至誠堂製藥株式会社  
SHISEIDO PHARMACEUTICAL INC.  
日本奈良御所市茅原220-1  
220-1, Chihara, Oaza, Gose-city, Nara, Japan

【有効成分及含量】一日量(6粒)中：

有効成分	含量
Sodium Bicarbonate	300mg
Magnesium Carbonate	600mg
Magnesium Aluminometasilicate	800mg
Scopolia Extract(東莨菪萃取)	30mg
Biodiastase(消化酵素)	350mg
Ursodeoxycholic Acid	20mg

其他成分(賦形劑)：

Carmellose Calcium, Microcrystalline Cellulose, Lactose Hydrate, Potato Starch, Tartrazine, Erythrosine, Titanium Oxide

【用途(適應症)】 緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多、幫助消化

【不得使用族群】

- 曾因本藥成分引起過敏的人
- 哺乳婦請勿服用本藥，若服用本藥時請避免哺乳

【用法・用量】

年齡	使用量	使用次數
成人及12歲以上	1次2粒	1日3次
6歲以上未滿12歲	1次1粒	或需要時服用

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【諮詢專線】(02)2721-4019

請詳閱說明書後使用



4 721401 925001

# 綜合胃腸藥

胃痛・胃もたれ・消化不良


マックローム®  
Machrome ED

72cap.

第2類医薬品

第2類医薬品

西薬(含生薬成分)



72cap.

# 胃養健膠囊

胃痛・宿酔造成的脹氣・消化不良

マックローム® ED

至誠堂製薬株式会社

# 胃養健膠囊

注意

- 次の人は服用しないこと。  
(1)透析療法を受けている人。  
(2)本剤又は本剤の成分によるアレルギー一症状を起こしたことがある人。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 服用に際しては、説明書をよく読むこと。
- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

保存期限 LOT.




衛署薬輸字第023853號

藥商 德佑藥品有限公司  
台北市南京西路46號5樓  
www.dokuyu.com.tw

經銷商：弘鑑貿易股份有限公司  
台北市敦化南路一段190巷45號7樓  
製造販売 至誠堂製薬株式会社  
SHISEIDO PHARMACEUTICAL INC.  
日本奈良御所市茅原220-1  
220-1, Chihara, Oaza, Gose-city, Nara, Japan

第2類医薬品

西薬(含生薬成分)



72cap.

# 綜合胃腸藥

胃痛・二日酔のむかつき・消化不良

マックローム® ED

至誠堂製薬株式会社



【有効成分及含量】一日量(6粒)中：

有効成分	含量
Sodium Bicarbonate	300mg
Magnesium Carbonate	600mg
Magnesium Aluminometasilicate	800mg
Scopolia Extract(東莨菪萃取)	30mg
Biodiastase(消化酵素)	350mg
Ursodeoxycholic Acid	20mg

其他成分(賦形劑)：

Carmellose Calcium, Microcrystalline Cellulose, Lactose Hydrate, Potato Starch, Tartrazine, Erythrosine, Titanium Oxide

【用途(適應症)】 緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多、幫助消化

【不得使用族群】

- 曾因本藥成分引起過敏的人
- 哺乳婦請勿服用本藥，若服用本藥時請避免哺乳

【用法・用量】

年齡	使用量	使用次數
成人及12歲以上	1次2粒	1日3次
6歲以上未滿12歲	1次1粒	或需要時服用

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【諮詢專線】(02)2721-4019

請詳閱說明書後使用



4 721401 910403

72Capsules

西藥(含生藥成分)

マックローム®  
Machrome ED  
Capsules

胃痛・二日酔の  
むかつき・消化不良

マックローム® ED

至誠堂製薬株式会社



胃養健膠囊

注意

- 次の人は服用しないこと。  
(1)透析療法を受けている人。  
(2)本剤又は本剤の成分によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 服用に際しては、説明書をよく読むこと。
- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

保存期限 LOT.

Blank box for expiration date and lot number



衛署藥輸字第023853號

藥商 德佑藥業有限公司  
台北市南京西路46號5樓  
www.dokuyu.com.tw

經銷商：弘鑑貿易股份有限公司  
台北市敦化南路一段190巷45號7樓  
製造販売元 至誠堂製薬株式会社  
SHISEIDO PHARMACEUTICAL INC.  
日本奈良御所市茅原220-1  
220-1, Chihara, Oaza, Gose-city, Nara, Japan

マックローム®  
Machrome ED  
Capsules

72Capsules

医薬品

胃養健膠囊®  
Machrome ED  
Capsules

胃痛・宿酔造成的脹氣・消化不良

マックローム® ED

至誠堂製薬株式会社

【有効成分及含量】一日量(6粒)中:

有効成分	含量
Sodium Bicarbonate	300mg
Magnesium Carbonate	600mg
Magnesium Aluminometasilicate	800mg
Scopolia Extract(東莨菪萃取)	30mg
Biodiastase(消化酵素)	350mg
Ursodeoxycholic Acid	20mg

其他成分(賦形劑):

Carmellose Calcium, Microcrystalline Cellulose, Lactose Hydrate, Potato Starch, Tartrazine, Erythrosine, Titanium Oxide

【用途(適應症)】 緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多、幫助消化

【不得使用族群】

- 曾因本藥成分引起過敏的人
- 哺乳婦請勿服用本藥，若服用本藥時請避免哺乳

【用法・用量】

年齡	使用量	使用次數
成人及12歲以上	1次2粒	1日3次
6歲以上未滿12歲	1次1粒	或需要時服用

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【諮詢專線】(02)2721-4019

請詳閱說明書後使用