# 樂朗眼藥水

## ASUPARAITO SULFA

衛署藥輸字第 024208 號

結膜炎、麥粒腫、眼角潰爛等疾病會產生眼瞼眼皮腫、痛及癢，這是由於葡萄球菌及鏈鎖球菌等的細菌所感染而引起的眼疾。 Asuparaito 眼藥水是針對造成眼病的細菌有長期持續的抗菌作用，可以鎮靜因感染時所引起眼睛癢等的炎症，配合持續性 Sodium Sulfamethoxazole 及抗炎症劑 Dipotassium Glycyrrhizinate 的抗菌性眼藥。

【成份・份量】每公撮含：

| | |
|---|---|
| Sodium Sulfamethoxazole..... | 40mg |
| Dipotassium Glycyrrhizinate..... | 2mg |
| Dried Sodium Sulfite..... | 2mg |
| Disodium Edetate..... | 0.05mg |
| Methyl Parahydroxybenzoate..... | 0.3mg |
| Propyl Parahydroxybenzoate..... | 0.15mg |
| Boric Acid..... | 0.8mg |
| Sodium Borate..... | 0.95mg |
| Purified Water.....added to make 1 ml | |

【適應症】結膜炎、麥粒腫、眼瞼糜爛

【用法用量】每日 3～6 次，每次 1～3 滴，滴於眼睛
本藥須由醫師處方使用

【包　裝】100 公撮以下塑膠瓶裝

【儲　藏】25℃以下儲存

**製造廠：CHUSHIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.**
**廠　址：** 504-2 KAMIKOIZUMI, NAMERIKAWA-CITY TOYAMA-PREF, JAPAN

**藥　商：優德貿易有限公司**
**地　址：** 台北市八德路三段 12巷 31弄 24號 1樓

製造番号　有効期限 4 [illegible]

【使用時的注意事項】

1.請遵守下列注意事項，否則症狀可能會惡化、容易引起副作用

2. 請勿長期連續使用

3.下列患者請於使用前詢問醫師或藥師

(1)目前正接受醫師治療的人

(2)本人或家族中有過敏體質的人

(3)曾經因用藥引起過敏症狀的人

(4)有劇烈眼痛的人

4.下列的情況時，請立刻停止使用並持此說明書向醫師或藥師詢問

(1)使用後出現下列症狀

| 關係部位 | 症狀 |
|---|---|
| 皮膚 | 發疹、發熱、發癢 |
| 眼睛 | 充血、發癢、腫 |

(2)使用 3～4 日後症狀仍無改善時

＜關於麥粒腫的注意事項＞

眼睛癢時，請注意不要再刺激眼睛。容易引起麥粒腫的體質、或過度疲勞，睡眠不足等體力較差時較容易引起麥粒腫，請注意避免疲勞、睡眠要充份

＜關於用法用量的注意事項＞

(1)小孩的使用請在保護者的指導監督下使用

(2)容易的前端請不要接觸到眼皮及睫毛，已混濁的藥瓶請勿使用

(3)戴著隱形眼鏡時不可使用

(4)只限於點眼睛用

＜關於成份的注意事項＞

本藥劑點眼睛後，有時口中會感覺有甜味，這是成分 Dipotassium Glycyrrhizinate 成份的關係通過淚腺流入口中所造成，非品質等有異常

【使用時的注意事項】

(1)請勿置於陽光直接照射處並上緊蓋子放置於乾燥陰涼處，勿超過 25℃

(2)請勿放置小孩可取得處

(3)請勿改裝於其他容器中，以避免誤用及變質

(4)請不要與他人共同使用

(5)超過有效期限請勿使用。另外，即使在標示的期限內，開封後爲了保持品質也請儘快使用

※請不要放置於車中及暖房器具的附近等、或高溫 40℃以上的地方，以防容器變形

94.