衛寶血液透析濃縮液 751

Dialysis Concentrate 751 A-component

衛署藥輸字第 024291 號

本藥限由醫師使用

組成：每公升濃縮液含有下列成分及含量

組成	每公升		
NaCl 氯化鈉	210.7 g	Na^+	3605.0 mmol
KCl 氯化鉀	5.22 g	K^+	70.0 mmol
$MgCl_2 \bullet 6H_2O$ 氯化鎂含六結晶水	3.56 g	Mg^{2+}	17.5 mmol
$CaCl_2 \bullet 2H_2O$ 氯化鈣含二結晶水	7.72 g	Ca^{2+}	52.50 mmol
Acetic Acid 醋酸	6.31 g	CH_3COO^-	105.0 mmol
Glucose 葡萄糖	70.00 g	Cl^-	3815.00 mmol
加水至 1000 ml		Glucose	388.43 mmol

用法用量：以下列方式製備立即可用之血液透析液：1 公升 751 型 + 32.775 公升 純水 + 1.225 公升 8.4% $NaHCO_3$ 溶液/ BiCart ®，可得成分如下之透析液。

Na^+	138.00 mmol/l	Cl-	109.00 mmol/l
K^+	2.00 mmol/l	HCO3-	32.00 mmol/l
Mg^{2+}	0.50 mmol/l	Glucose	2.00 g/l
Ca^{2+}	1.50 mmol/l		
CH_3COO^-	3.00 mmol/l	Osmol.cal./ theor.滲透壓	297 mOsm/l

適應症：血液透析液。

應用型態：體外重碳酸鹽血液透析。僅在合併使用重碳酸鹽血液濃縮液 ($NaHCO_3$ 8.4% 或 6.6%)，或 BiCart 重碳酸鈉粉匣 時，依特定比例使用 A 成分濃縮液。包含使用 Gambro 血液透析機聯機立即製備流程〔請參考相關機器操作者手冊〕。使用前以適當方法針對稀釋後的透析液進行氣體分析。

副作用：以下症狀曾被記載，含低滲透壓（hypotonia）、噁心、嘔吐和痙攣等。

禁忌症：高血鉀症〔適用於含鉀之濃縮液〕，低血鉀症〔適用於不含鉀之濃縮液〕，無法管控之血液凝結異常。血液恆定不穩之病人可能有其他體外治療方式。

注意事項：

8. **依照國家規定，以適量的合格之純水稀釋後方可使用，稀釋後需立即使用。**
9. **棄置殘餘物。**
10. **時時檢查稀釋後的血液透析液濃度。**
11. **透析液稀釋前後若有沉澱或溶液發生渾濁，切勿使用。**
12. **如封蓋破損則不可使用，本品需保持密封。**
13. **本品無熱原。**
14. **儲存條件：密封存放於 25°C 以下。**

製造日期：　　製造批號：　　保存期限：

製造廠：Gambro Dialysatoren GmbH & Co KG

製造廠地址：Ermelesstrasse 76, 72379 Hechingen, Germany

藥商：衛寶股份有限公司 Gambro Taiwan Ltd.

藥商地址：台北市民生東路二段 143 號 11 樓