KAZEWAN DAY NIGHT

朝・昼 不嗜睡 1日2回朝・昼食後に

夜 緩解症状 充分休息 1日1回夕食後に

白天活動不會想睡覺(早餐. 午餐飯後服用配合Caffeine)
晚餐飯後服用, 一盒中有二種型態, 便利的綜合感冒藥

德佑日夜 感冒藥 糖衣錠

KAZEWAN DAY NIGHT TABLET

朝昼・夜TYPE
1日3回服用

第②類医薬品

12錠 (2日分)

早上・中午用 不嗜睡
1日2回, 飯後服用

晚上用 緩解症状・充分休息
1日1回, 飯後服用或睡前使用

総合かぜ薬 カゼワンデイナイト

朝・昼 不嗜睡 1日2回朝・昼食後に

夜 緩解症状 充分休息 1日1回夕食後に

12錠(2日分)

総合かぜ薬 カゼワンデイナイト

朝・昼 不嗜睡 1日2回朝・昼食後に

夜 緩解症状 充分休息 1日1回夕食後に

12錠(2日分)

総合かぜ薬 カゼワンデイナイト

朝・昼 不嗜睡 1日2回朝・昼食後に

夜 緩解症状・充分休息 1日1回夕食後に

緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛 咳嗽、喀痰、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)

保存期限　　製造批號

條碼

KD-4

01
248

德佑日夜感冒藥糖衣錠

■ 有效成分及含量

有效成分	日錠 (黃色錠)	夜錠 (白色錠)
Acetaminophen	150mg	150mg
Chlorpheniramine Maleate	1.25mg	1.25mg
Anhydrous Caffeine	166.5mg	—
Tipepidine Hibenzate	8.5mg	8.5mg
dl-Methylephedrine Hydrochloride	7mg	7mg
Glycyrrhiza extract	25mg	25mg

■ 其他成分(賦形劑)

Lactose Hydrate, Titanium Oxide, Carnauba Wax, Low Substituted Hydroxypropylcellulose, Riboflavin, Hydroxypropylcellulose, Carmellose Calcium, Magnesium Stearate, Hypromellose

■ [用途(適應症)]

緩解感冒之各種症狀 (流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛 咳嗽、喀痰、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)

■ [不得使用族群]

① 曾因服用本藥或其他感冒藥, 引發氣喘的人
② 曾因服用本藥或其他感冒藥, 引發過敏的人

■ 用法用量

年齡	日錠 (黃色錠)	中午 (黃色錠)	夜錠 (白色錠)
12歲以上	2錠	2錠	2錠
	飯後服用	飯後服用	晚餐飯後或睡前服用
6歲以上未滿12歲	1錠	1錠	1錠
	飯後服用	飯後服用	晚餐飯後或睡前服用
3歲以上未滿6歲	1/2錠	1/2錠	1/2錠
	飯後服用	飯後服用	晚餐飯後或睡前服用
未滿3歲	請洽醫師診治, 不宜自行使用		

■ [其他(注意事項等)]

[注意事項]請詳閱說明書後使用
[許可證字號]衛署藥輸字第02443838號
[諮詢專線]02-2577-5772
[諮詢]　別[]醫師藥師藥劑生指示藥品

BMI IN JAPAN

製造廠 ⑤ 至誠堂製藥株式会社
SHISEIDO PHARMACEUTICAL INC.
日本国奈良県御所市茅原220-1
220-1 Chihara Oaza Gose-city
Nara Japan

藥商 ⑫ 德佑藥品有限公司
台北市敦化南路一段3號2樓
www.dokuyu.com.tw

德佑日夜感冒藥糖衣錠

朝・昼　夜

総合かぜ薬 KAZEWAN DAY NIGHT カゼワン®デイナイト 朝昼・夜TYPE 1日3回服用

白天活動不會想睡覺(早餐. 午餐飯後服用配合Caffeine)
晚餐飯後服用, 一盒中有二種型態, 便利的綜合感冒藥

德佑日夜感冒藥糖衣錠

朝・昼　夜

保存期限　製造批號　條碼

緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛
咳嗽、喀痰、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)

総合かぜ薬 KAZEWAN DAY NIGHT カゼワン®デイナイト

德佑日夜感冒藥糖衣錠

有效成分及含量

有效成分	日錠 (黃色錠)	夜錠 (白色錠)
Acetaminophen	150mg	150mg
Chlorpheniramine Maleate	1.25mg	1.25mg
Anhydrous Caffeine	16.65mg	—
Tripeptide Hibenzate	8.5mg	8.5mg
di-Methylephedrine Hydrochloride	7mg	7mg
Glycyrrhiza extract	25mg	25mg

其他成分(賦形劑)

Lactose Hydrate, Titanium Oxide, Carnauba Wax, Low Substituted Hydroxypropylcellulose, Riboflavin, Hydroxypropylcellulose, Carmellose Calcium, Magnesium Stearate, Hypromellose

[用途(適應症)]

緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛
咳嗽、咳痰、發寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)

[不得使用族群]

① 曾因本藥成分引起過敏的人
② 曾因服用本藥或其他感冒藥, 引發氣喘的人
解熱鎮痛藥後, 引發氣喘的人

用法用量

年齡	日錠 (黃色錠)	中午 (黃色錠)	夜錠 (白色錠)
12歲以上	2錠日錠 飯後服用	2錠日錠 飯後服用	2錠夜錠 晚餐飯後或睡前服用
6歲以上未滿12歲	適用成人劑量之1/2		
3歲以上未滿6歲	適用成人劑量之1/4		
未滿3歲	請洽醫師藥治, 不宜自行使用		

類　別] 醫師藥師藥劑生指示藥品
[器 胸 專 級] 02-2577-5772
[許可證字號] 衛署藥輸字第024438號
[注 意 事 項] 請詳閱說明書後使用

MADE IN JAPAN

製 造 商 德佑藥品有限公司
台北市敦化南路一段3號2樓
www.dokuyu.com.tw

經 銷 商 德廣貿易有限公司
台北市八德路三段51弄24號1樓

製造販売 資生堂製薬株式会社 SHISEIDO PHARMACEUTICAL INC
日本国奈良県御所市茅原220-1
220-1 Chihara Oaza Gose-city Nara Japan

JP20170802 +2