

病患使用須知

衛署藥輸字第024573號

在您開始服用后安錠前，請仔細研讀本須知。如果有任何疑問，應請您的醫師、藥師或家庭計畫門診人員為您解說。請妥善保存本須知，稍後您可能需要再參考它。

一、您服用的藥品是甚麼：
您服用的藥品名稱是后安錠 (NORLEVO) 1.5毫克，錠劑。
● 主成分：levonorgestrel。
● 每錠含 levonorgestrel 1.5mg。
● 后安錠亦包含以下成分：
lactose monohydrate, maize starch, povidone, anhydrous colloidal silica, magnesium stearate。
● 每包后安錠含1顆圓形、白色錠劑。Levonorgestrel屬於所謂的「Progestogens」類藥品。

二、本藥品之使用時機：
后安錠為一種緊急的口服避孕藥品。
本品適應症：無事前避孕措施之緊急避孕措施。
● 何為緊急避孕？
無避孕措施的性交後，為預防受精所使用之補救方法。
● 何時可使用緊急避孕？
本治療法須在無避孕措施的性交後儘速使用，最好在12小時內，最久不超過72小時 (3天)，特別是在下列情形：
1. 性交時您自己或您的性伴侶未使用避孕方法。
2. 忘記服用您的避孕藥，超過最長可接受延遲的時間。此時應詳細閱讀該避孕藥的使用須知。
3. 保險套破損、滑脫、被不適當移除、或忘記使用保險套。
4. 子宮內避孕器被排出。
5. 陰道隔膜或避孕用子宮帽太早被移除或移位。
6. 性交中斷法失敗、或當使用週期禁慾法時，在有可能受孕的期間性交。
7. 被強暴。

三、注意！
● 何時不應使用本藥品：
對levonorgestrel或后安錠的任何賦形劑過敏。
● 特殊警告及使用上注意事項
緊急避孕是一種臨時性方法，不應取代一般常規性的避孕法。緊急避孕不是在任何情況下都能防止懷孕的發生。
緊急避孕可能造成荷爾蒙過量負荷，並不建議經常或連續使用。
緊急避孕不能取代常規性荷爾蒙避孕法。
緊急避孕不能中斷懷孕。

在服用后安錠之後，通常月經的流量正常且在預定的日期來臨，但有時也會發生提早或延後幾天的情形。在服用后安錠之後，月經延後超過5天以上，或在預定月經來臨的日期發生不正常的出血，應該要驗孕以確認是否懷孕。

使用緊急避孕並不能忽略對性病必須的注意，仍應採取預防性病傳染的措施 (詳見第8段，建議及衛生教育)。

對於有子宮外孕病史、輸卵管發炎病史、或有嚴重消化性疾病會影響藥品吸收的病患，不建議使用后安錠。

在服用第一劑後的三小時內如發生嘔吐的情形，建議馬上補服另一劑。

● 與其他藥品間之交互作用
與抗癲癇藥 (phenobarbital, phenytoin, primidone, carbamazepine)、及某些藥 (rifabutin, rifampicin, ritonavir, and griseofulvin) Hypericum perforatum (ST. John 降低或被抑制)。

為了避免與其他藥品間的交互作用，您必須告知您的醫師或藥師，任何您目前正在服用的其他藥品。

● 懷孕及授乳
懷孕
本藥品不建議已懷孕婦女使用，也無法中止懷孕。萬一避孕失敗，必須注意胎兒的發育是否正常。
授乳
Levonorgestrel會分泌至乳汁中，因此建議在服用后安錠前先行授乳，及避免服用後馬上授乳。

● 開車與操作機器的影響
並沒有關於影響開車與對操作機器能力的報告。

四、本藥品應如何使用
本藥須由醫師處方使用。

● 劑量
本治療法須服用一片錠劑，此法在無避孕措施的性交後愈早使用效果愈好。最好在12小時內服用，最久不超過72小時 (3天)。
后安錠可在月經週期的任何時候服用。
在使用本緊急避孕藥後，建議在下次月經來臨前使用局部避孕法 (如：保險套、殺精劑、

子宮頸帽)。使用后安錠後可以繼續使用常規性的荷爾蒙避孕法。

如果您正在使用口服避孕藥的情形下，服用了本藥品，您應該繼續使用原來的避孕藥。在使用后安錠後，若下次預定時間的月經沒有來，應該要驗孕以確認是否懷孕。

● 使用途徑及方法
口服
本藥品應與開水一起服用。

● 使用時機及使用頻率
詳見劑量之說明。

● 治療的期間
詳見劑量之說明。

● 使用過量時應如何處理
目前並無服用大量本藥品而引起急性中毒的報告

● 忘記使用時應如何處理
本藥品如未在72小時內準時服用，無法保證其效果。

五、不良反應
如同其他藥品一樣，本藥品可能會在某些人產生各種不同程度的不舒服。

已觀察到的不良反應有：
- 噁心及嘔吐。
- 暈眩、疲倦、頭痛。
- 腹痛。
- 乳房觸痛感。
服用此藥後可能發生出血。
若發生本須知所未列舉的不良反應，請通知您的醫師或藥師。

六、儲存狀態
● 不要超過包裝外盒註明之使用期限
● 儲存特殊注意事項
將容器儲存在外盒中。
● 請注意本藥品內眼可判斷之變質警告：如有變質之虞，應將它歸還給您的藥師。

七、本須知之修訂日期
西元2006年12月

八、建議及衛生教育
● 一些有關月經週期及避孕的資訊
月經週期
是指兩次月經來潮之間所經過的時間。正常情形下，月經週期會持續28天，但其長度可能因人而異。

在婦女未懷孕的情形下，月經會如期來臨。在月經週期中間時，兩個卵巢其中之一會排出一個卵 (此刻稱為「排卵」)。通常排卵會發生在月經週期的正中間，但它亦可能發生於月經週期的任何時候。
如果精蟲接近卵子，受精 (亦即卵子與精子的結合以產生胚胎) 即可能發生。
數天後，受精卵著床於子宮內，懷孕開始。
避孕方法主要是用以預防：
- 排卵：口服避孕藥，或；
- 受精 (卵子與精子的結合)：保險套，或；
- 受精卵著床：子宮內避孕器。

緊急避孕
當性交發生於進行排卵之數小時或數天內，這時受精的可能性最高，而緊急避孕主要是用來阻止排卵或預防受精卵著床。但只要受精卵一著床，本藥品即失去其避孕的效果。
若無避孕，婦女性交後無法排除懷孕之可能。若您已服用本藥品而仍未使用常規性避孕法，極力建議您找您的醫師諮詢適合您的避孕方法。

● 有關傳染性病之危險性的建議
如果您擔心會懷孕，這可能代表性交時您未使用保險套 (或您使用不當)。
如果您不注意您的性伴侶之健康狀況，或您有數位性伴侶，您有可能會感染性病或愛滋病。
您應儘速請教您的醫師，以得到早期診斷及必要時之早期治療。
下次性交時，建議您採取適當的措施，以預防性病及不想要的懷孕，並避免感染愛滋病。請詢問您的醫師或家庭計畫中心。

國外許可證持有者：
Laboratoire HRA Pharma
15, rue Beranger, 75003
Paris - France

製造廠：
LCO SANTE
17, rue de Pontoise
95520 OSNY - France

藥商：
美吾華股份有限公司
台北市復興北路167號5F

33