

# トクホン 外用消炎鎮痛スター

## 肩こり・腰痛・筋肉痛に

### ◆特長：

トクホンは、炎症を抑え痛みをやわらげるサリチル酸メチル、血行をよくするビタミンE、皮ふの炎症を抑えるグリチルレチン酸を配合して、肌にやさしく、筋肉の炎症と痛みを抑えるのに適した貼り薬です。四スミを丸くして、使用中はがれにくくしています。

### 使用上の注意

●してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる）

1. 次の人は使用しないこと

本剤によるアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）をおこしたことがある人

2. 次の部位には使用しないこと 1) 目の周囲、粘膜等 2) 湿疹、かぶれ、傷口

●相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

1) 本人又は家族がアレルギー体質の人

2) 今までに薬や化粧品等によりアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）をおこしたことがある人

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談すること

1) 使用後、皮ふに発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合

2) 5~6日間使用しても症状の改善が認められない場合

### ◆効能又は効果：

患部の痛みをやわらげます。（打撲、捻挫、筋肉痛、関節痛、腰痛、肩こり、筋肉疲労）

### ◆用法及び用量：

薬剤面をおおったはく離紙をはがし、1日数回患部に貼付して下さい。

1. 小児（15歳未満）に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させ、2歳未満の小児は使用する前に医師または薬剤師にご相談ください。

2. G6PD欠乏の方は使用しないでください。

3. 患部を清潔にしてから使用して下さい。

4. 大面積に使用しないで下さい。

5. 皮ふの弱い人は、同じ所に続けて使用しないで下さい。

6. 使用前に腕の内側の皮ふの弱い所に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれないことを確かめてから使用して下さい。

### ◆保管及び取扱い上の注意：

1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。

2. 直射日光を避け、なるべく涼しい所に保管して下さい。

3. 開封後は保存袋に入れて保管して下さい。

4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

### ◆包装：1000枚以下小箱入り / 1枚サイズ6.5cmX4.2cm（1枚中の有効成分及び分量）

成分	分量	はたらき
l-メントール	32.9 mg	知覚神経を軽くマヒさせる
dl-カンフル	5.6 mg	痛みをやわらげる
サリチル酸メチル	36.9 mg	炎症を抑え痛みをやわらげる
ビタミンE酢酸エステル	6.8 mg	血行をよくする
グリチルレチン酸	0.9 mg	皮ふの炎症を抑える

添加物として酸化亜鉛、ジブチルヒドロキシトルエン、生ゴム、ポリイソブレン、ロジンエステル、その他2成分を含有します。



東京都中央区日本橋本町4-1-2

(O) 4-1-2, Nihonbashi-Honcho, Chuo-Ku, Tokyo 103-0023, Japan

(P) 1010, Aza Yamazaki, Miyashiro-Machi, Minamisaitama-Gun, Saitama 345-0824, Japan