

～專為壓力所造成的眼睛矇霧、眼睛疲勞～

碧麗眼藥水 Marine Loupe

衛署藥輸字 024904 號

「碧麗眼藥水」含有舒緩眼睛酸痛的Neostigmine、Chondroitin、Glycyrrhizinate、配合維生素B6及維生素E、氨基酸及Aspartate等7種有效成份做成的眼藥，有助於舒緩眼睛發炎、眼睛疲勞等症狀。

■有效成分 Each mL contains:

Neostigmine Methylsulfate	0.05mg
Dipotassium Glycyrrhizinate	2.5mg
Pyridoxine Hydrochloride (Vit. B6)	0.5mg
Taurine (牛磺酸)	5.0mg
Tocopherol Acetate (Vit. E)	0.25mg
Sodium Chondroitin Sulfate (軟骨素)	2.5mg
Potassium and Magnesium L-Aspartate (equal mixture)	10.0mg

■賦形劑成分：

Boric Acid · Sodium Borate · Chlorobutanol · Benzalkonium Chloride Solution (10%) ·
Disodium Edetate Hydrate · ℓ -Menthol · Glycerin · Polysorbate 80 · Purified Water

■適應症 暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、眼睛疲勞。

■用法、用量 一天3-6次，每次1-2滴。

注意事項

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。(25°C以下)
3. 使用前，請洗淨雙手。
4. 請依照藥品標示使用。
5. 過期眼藥水，請勿使用。瓶裝之眼藥水，開瓶30天後請勿繼續使用。
6. 藥液混濁、變色或出現異物時請丟棄。
7. 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口。
8. 使用兩種眼藥水時，請隔開至少5分鐘後點藥。
9. 使用兩種眼藥時，請先使用藥水再用藥膏；並請隔開至少10分鐘後點藥。

警語

1. 以下情況應停藥立即就醫：
 - (1)連續使用三天（或72小時）症狀未解除。
 - (2)使用後產生眼睛劇痛、視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
 - (3)發生過敏反應。
 - (4)青光眼（Glaucoma）患者。
2. 對本藥之主要成分、防腐劑或其他賦形劑過敏者，不推薦使用。
3. 正在接受醫師治療或醫師處方眼藥之患者，不應自行購買使用。

類別：本藥為醫師 藥師 藥劑生指示藥品

包裝：100mL 以下塑膠瓶裝

製造廠 SAGA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
481, KOKURA, OAZA, KIYAMA-MACHI, MIYAKI-GUN, SAGAKEN, JAPAN

藥商 順仁西藥行
新北市中和區中山路2段312巷12號 02-2240-4959

總經銷 世達藥品工業股份有限公司
407台中市西屯區工業區15路2號 04-23593862