医薬品

冠保酸痛貼布

12枚入 1枚（10cm×14cm）

肌にやさしい弱酸性

★Indomethacinが痛みの元に浸透!

肩こりに伴う
肩の痛み
腰痛
関節痛に

REFENDA ID 0.5%

INDOMETHACIN 経皮吸収型鎮痛消炎剤

伸縮タイプ

保存に便利 チャック付

弱酸性

1枚（10cm×14cm）

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛に

お肌にやさしい弱酸性
経皮吸収型鎮痛消炎剤

12枚入

インドメタシンが痛みの元に浸透 **REFENDA ID 0.5%** **Indomethacin配合** 1枚:10cm×14cm

---

冠保酸痛貼布
REFENDA ID 0.5%

衛署藥輸字第025094號

REFENDA ID 0.5%為非類固醇 (NSAID) 性鎮痛消炎劑，具有鎮痛、消炎作用。

【有効成分及含量】 一片(10 cm x 14cm) 中：

有效成分	含 量	說 明
Indomethacin	70mg	非類固醇性消炎劑，具有消炎、鎮痛及解熱作用

其他成分(賦形劑)：Benzyl Alcohol、Polysorbate 80、Partially Neutralized Polyacrulate、Partially Hydrolyzed Polyvinyl Alcohol、Carmellose Sodium、Concentrated Glycerin、Water、D-Sorbitol Solution (70%)、Carboxyvinyl Polymer、Tartaric Acid、Disodium Edetate Hydrate、Tocopherol Acetate、Ascorbic Acid、l-Menthol、Kaolin、Titanium Oxide、Dihydroxyaluminum Aminoacetate、1,3-Butylene Glycol、Castor Oil、Perfume

【用途（適應症）】 暫時緩解局部疼痛

【不得使用族群】
1. 曾因本藥成分引起過敏的人
2. 曾經發生過氣喘的人
3. 濕疹、皮疹、傷口、足癬、圓癬等或者已經化膿的患部

【用法用量】

請先清潔患部並保持患部乾爽，再把貼布裡面的塑膠膜拉開，將貼布敷於患處，每日一日或兩次（可視患部情況而定）。如有需要，亦可用繃帶綁緊藥布。

貼 入浴前一小時請將藥布撕去，浴後半小時後再使用之。

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品

【諮詢專線】 0800-020-788

衛生福利部食品藥物管理署
校對之章

製造廠：TAKAMITSU CO., LTD.
(TAKAMITSU HANDA PLANT)
2-6-5 MIZUHO-CHO HANDA-SHI AICHI JAPAN

藥商 優德貿易有限公司
台北市八德路三段12巷51弄24號1樓
www.dokuyu.com.tw

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
1. 正在接受醫師治療的人
2. 未滿15歲

二、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦

三、其他使用上注意事項：
1. 為防止兒童誤用請妥善保管
2. 避免陽光直射
3. 勿超過建議使用量
4. 本藥限於皮膚外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜
5. 兒童使用時，應有成人在一旁協助
6. 皮膚較為敏感的人，使用前先剪下1-2cm的小片貼在手腕內部或其他皮膚較易敏感處半天以上，確認不會有發疹、發紅、發癢及皮疹的現象再使用
7. 請勿連續使用超過兩星期
8. 開封後未用完之貼布請放回鋁箔夾鏈袋內，並確實關緊夾鏈袋
9. 超過保存期限請勿使用

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅、發癢、腫脹、刺痛感、灼熱感、皮膚乾裂

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
1. 若有任何不適情況產生
2. 自覺狀況沒有改善或更惡化
3. 使用5-6日後，症狀仍然沒有改善

【包裝】 14g(10cm x 14cm)/片，1000片以下鋁箔袋裝

【儲存】 25°C以下儲存

※使用前請詳閱說明

製造批號

保存期限

4 987487 102617

GCP 查核/結案報告 審查意見

件	商品名：「BMS-936558(Nivolumab) vial 100mg/10ml」結案報告	計畫編號：CA209-214 查核案號：107INS-R10

意見：

日

仿單標籤粘貼表

產品名稱	冠保酸痛貼布	申請廠商	優德貿易有限公司
衛生福利部食品藥物管理署給證號碼	衛署藥輸 字 第 025094 號		

冠保酸痛貼布

REFENDA ID 0.5%

衛署藥輸字第025094號

REFENDA ID 0.5% 為非類固醇(NSAID)性鎮痛消炎劑，具有鎮痛、消炎作用。

【有効成分及含量】 一片(10 cm x 14cm) 中：

有效成分	含 量	說 明
Indomethacin	70mg	非類固醇性消炎劑，具有消炎、鎮痛及解熱作用

其他成分(賦形劑)：Benzyl Alcohol、Polysorbate 80、Partially Neutralized Polyacrulate、Partially Hydrolyzed Polyvinyl Alcohol、Carmellose Sodium、Concentrated Glycerin、Water、D-Sorbitol Solution (70%)、Carboxyvinyl Polymer、Tartaric Acid、Disodium Edetate Hydrate、Tocopherol Acetate、Ascorbic Acid、l-Menthol、Kaolin、Titanium Oxide、Dihydroxyaluminum Aminoacetate、1,3-Butylene Glycol、Castor Oil、Perfume

【用途（適應症）】 暫時緩解局部疼痛

【不得使用族群】

1. 曾因本藥成分引起過敏的人
2. 曾經發生過氣喘的人
3. 濕疹、皮疹、傷口、足癬、圓癬等或者已經化膿的患部

【用法用量】

請先清潔患部並保持患部乾爽，再把藥布裡面的塑膠膜拉開，將藥布貼附於患處，每日一次或二次(可自行視患部情況而定)，如有需要，亦可用繃帶綁緊藥布。

貼 入浴前一小時請將藥布撕去，浴後半小時後再使用之。

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品

【諮詢專線】 0800-020-788

製造廠：TAKAMITSU CO., LTD.
(TAKAMITSU HANDA PLANT)
2-6-5 MIZUHO-CHO, HANDA-SHI, AICHI, JAPAN

藥商 德佑藥品有限公司
台北市敦化南路一段 3 號 2 樓
www.dokuyu.com.tw

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  1. 正在接受醫師治療的人
  2. 未滿15歲

二、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦

三、其他使用上注意事項：
  1. 為防止兒童誤用請妥善保管
  2. 避免陽光直射
  3. 勿超過建議使用量
  4. 本藥限於皮膚外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜
  5. 兒童使用時，應有成人在一旁協助
  6. 皮膚較為敏感的人，使用前先剪下1-2cm的小片貼在手腕內部或其他皮膚較易敏感處半天以上，確認不會有發疹、發紅、發癢及皮疹的現象再使用
  7. 請勿連續使用超過兩星期
  8. 開封後未用完之貼布請放回鋁箔夾鏈袋內，並確實關緊夾鏈袋
  9. 超過保存期限請勿使用

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅、發癢、腫脹、刺痛感、灼熱感、皮膚乾裂

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
  1. 若有任何不適情況產生
  2. 自覺狀況沒有改善或更惡化
  3. 使用5-6日後，症狀仍然沒有改善

【包裝】 14g(10cm x 14cm)/片，1000片以下鋁箔袋裝

【儲存】 25℃以下儲存

※使用前請詳閱說明

製造批號

保存期限

條碼