使用時請務必詳閱說明書。
又爲了必要時可以參閱請妥善保管。

點眼藥

NITIGAN EYE RUBY EYE DROPS

日岩艾眼舒 眼藥水

特徵：

NITIGAN EYE RUBY EYE DROPS 是配合了對眼睛疲勞有效的 Cyanocobalamin（紅色維生素 B12）與有緩解眼睛紅的 Naphazoline Hydrochloride 的紅色眼藥水。

適應症：

暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適，或眼睛紅，眼睛癢，眼睛疲勞。

用法用量：

一天 3 至 6 次，每次 1 至 2 滴。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

成分・份量：1ml 中

成分	含量	效用
Cyanocobalamin (Vitamin B12)	0.1mg	緩解眼睛疲勞
dl-Chlorpheniramine Maleate	0.1mg	緩解眼睛癢
Naphazoline Hydrochloride	0.02mg	有使毛細血管縮小、緩解眼睛紅的效能

注意事項：

一、 為防止兒童誤食請妥善保管。

二、 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

三、 使用前，請洗淨雙手。

四、 請依照藥品標示使用。

五、 過期眼藥水，請勿使用。瓶裝之眼藥水，開瓶 30 天後請勿繼續使用。

六、 藥液混濁、變色或出現異物時請丟棄。

七、 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口。

八、 使用兩種眼藥水時，請隔開至少 5 分鐘後點藥。

九、 使用兩種眼藥時，請先使用藥水再用藥膏；並請隔開至少 10 分鐘後點藥。

十、 讓孩童使用時，需在保護者的指導監督下使用。

十一、 配帶著軟式隱形眼鏡時，請勿使用。（可能會產生藥劑慢慢附著於鏡片、給予眼睛刺激、使鏡片變質）

十二、 請只作為點眼劑之用。

十三、 維生素 B12 會因日光或日光燈而退色，故使用後請栓緊瓶蓋，放入所附的外盒（遮光袋）保管。

十四、請勿改裝至其他容器。(可能成為誤用的原因或使品質改變)
十五、請勿與他人共用。(有眼疾的人使用的眼藥水讓別人使用的話，可能會透過眼藥水而感染)
十六、如藥液沾染衣物時，若立刻以水沖洗的話可以洗淨。

警語：
一、 以下情況應停藥立即就醫：
(一) 連續使用三天（或 72 小時）症狀未解除。
(二) 使用後產生眼睛劇痛、視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
(三) 發生過敏反應。
(四) 青光眼（Glaucoma）患者。
二、 對眼用製劑之主要成分、防腐劑或其他賦形劑過敏者，不推薦使用。
三、 正在接受醫師治療或醫師處方眼藥之患者，不應自行購買使用。
四、 過度使用血管收縮劑會增加眼睛紅腫。
五、 青光眼患者，除非經醫師指示，否則不要使用含血管收縮成分之製劑。

許可證字號：衛署藥輸字第 025638 號
包裝：100 毫升以下塑膠瓶裝。
儲存溫度：25℃以下

製造商：牛津製藥株式會社
USIZU SEIYAKU CO. LTD.
日本國佐賀縣小城市牛津町下砥川 1-2
1-2, SHIMOTOGAWA USHIZU-CHO, OGI-SHI, SAGA, JAPAN
藥　商：日岩生物科技有限公司
台中市西區五權五街 246 巷 22 號 1 樓