

# 日方眼藥水

## ASUPARAITO RX

衛署藥輸字第 025645 號

ASUPARAITO RX 是由 Neostigmine Methylsulfate 及緩解眼睛疲勞的 Vitamin B6 、B12 、Taurine 、Sodium Chondroitin Sulfate 及抑制眼睛癢 Chlorpheniramine Maleate 所配合而成紅色透明的眼藥水。

有效成分和其他的作用

成 份	1ml 中	作 用
Cyanocobalamin	0.06mg	維他命 B12
Neostigmine Methylsulfate	0.05mg	
Chlorpheniramine Maleate	0.3mg	有抗組織胺作用，緩和眼睛癢
Pyridoxine Hydrochloride	1mg	眼睛疲勞
Sodium Chondroitin Sulfate	2mg	眼睛疲勞
Taurine	5mg	眼睛疲勞

### 【添加劑】

每 1ml 含有 Chlorobutanol 0.5mg , Boric Acid 0.8mg , d- Boreanol 0.1mg , 1- Menthol 0.1mg , Methyl Parahydroxybenzoate 0.3mg , Propyl Parahydroxybenzoate 0.15mg , Sodium Borate 0.8mg , Sodium Chloride 5mg

【效能·效果】 眼睛疲勞、眼睛癢。

【用法·用量】 一天 3 至 6 次，每次 1 至 2 滴，滴於眼睛。

※醫師藥師藥劑生指示藥品

【包裝】 100 毫升以下塑膠瓶裝

製造廠：~~CHUSHIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.~~ 藥 商：~~德佑藥品有限公司~~  
504-2, KAMIKOIZUMI, NAMERIKAWA-CITY, 台北市敦化南路一段  
TOYAMA-PREF, JAPAN. 3 號 2 樓

### 【使用上之注意事項】

- (一)為防止兒童誤食妥善保管。
- (二)避免陽光直射，宜保存於陰涼之處，勿超過 25°C。
- (三)使用前，請先淨雙手。
- (四)請依照藥品標示使用。
- (五)過期眼藥水，請勿使用。瓶裝之眼藥水，開瓶 30 天後請勿繼續使用。
- (六)藥液混濁、變色或出現異物時請丟棄。
- (七)為避免污染藥品，使用時請勿碰觸藥瓶瓶口。
- (八)使用兩種眼藥水時，請隔開至少 5 分鐘點藥。
- (九)使用兩種眼藥時，請先使用藥水再使用藥膏，並請隔開至少 10 分鐘後點藥。
- (十)儲存條件：25°C 以下儲存。

### 【警語】

- (一)以下情況應停藥立即就醫：
  - (A)連續使用三天(或 72 小時)症狀未解除。
  - (B)使用後產生眼睛劇痛、視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
  - (C)發生過敏反應。
  - (D)青光眼(Glaucoma)患者。
- (二)對眼用製劑之主要成分、防腐劑或其他賦形劑過敏者，不推薦使用。
- (三)正在接受醫師治療或醫師處方眼藥之患者，不應自行購買使用。