Regaine®

2% Extra Strength External Solution "Canada"

落建®

生髮液

臨床實驗證明

停止異常掉髮

鞏固髮根

再生新髮

2%

Minoxidil

加拿大廠

男女適用

基礎型

4瓶裝

60ml X 4 四個月用量

落建® 2%
生髮液

Minoxidil
加拿大國

男女適用

基礎型

持續每天使用兩次
最快四個月
臨床實驗證明
可幫助男性及女性
再生新髮

三重作用

停止異常掉髮・鞏固髮根・再生新髮

要再生新髮，關鍵在於如何刺激毛囊將已萎縮的毛囊重新逐漸擴大，才能讓頭髮恢復生機。

多數的落髮起因於毛囊萎縮，越縮越小的毛囊讓頭髮無法再生。越是在毛囊萎縮的早期就開始治療，越有可能讓毛囊恢復，進而回到掉髮前的髮量。

主成分: 每ml含 Minoxidil 20mg

內容物:
- 四瓶落建生髮液 2% Minoxidil 60ml
- 內附二種使用器：
  按壓式噴頭/加長噴霧尖頭

注意事項:
- 僅可使用於18-65歲的掉髮者
- 心臟病患者，同時使用其他頭皮藥物者，使用前請先諮詢醫師或藥師
- 小心置放，遠離兒童。若不慎吞食，請立即就醫
- 僅能外用
- 可燃性；遠離火源

使用說明:
- 請先參考包裝內仿單再使用
- 每天兩次，每次使用1ml，均勻塗抹在落髮區的乾燥頭皮上
- 每天兩次並持續使用四個月是達到最佳生髮效果的方式
- 使用落建生髮液之前若要洗頭，可使用落建洗髮精徹底清潔頭皮，不阻塞毛囊也不傷害新生脆弱的頭髮

請上落建網站查詢更多生髮相關資訊：

www.regaine.com.tw

落髮分期

男性落髮分為七期，女性落髮分為三期，越早開始治療越有機會恢復落髮前的髮量。

第1期		輕度落髮 
第2期		
第3期		中度落髮 
第4期		
第5期		
第6期		重度落髮 
第7期		

製造廠:
Contract Pharmaceuticals Ltd. Canada

製造廠地址:
7600 Danbro Crescent Mississauga,
Ontario, Canada, L5N 6L6

藥商: 維生股份有限公司

藥商地址: 台北市大安區敦化南路
二段319號4樓

消費者服務專線:
0800-094-567

有效期限及批號: 標示於盒底

請儲存於室溫攝氏15-25度

醫師藥師藥劑生指示藥品

衛署藥輸字第025698號

6080940 121


Regaine

13D

4 712818 292077

LOT/MFG./EXP.:

0895CP
03/2015
02/2019

13D

LOT/MFG./EXP.:

0905CP
03/2015
02/2019

Regaine®

2% Extra Strength External Solution "Canada"

落建®

生髮液

臨床實驗證明
停止異常掉髮
鞏固髮根
再生新髮

2%

Minoxidil

加拿大廠

男女適用

基礎型

3瓶裝

60ml X 3 三個月用量

落建® 2%
生髮液

Minoxidil
加拿大廠

男女適用
基礎型

持續每天使用兩次
最快四個月
臨床實驗證明
可幫助男性及女性
再生新髮

三重作用

停止異常掉髮・鞏固髮根・再生新髮

要再生新髮，關鍵在於如何刺激毛囊將已萎縮的毛囊重新逐漸擴大，才能讓頭髮恢復生機。

多數的落髮起因於毛囊萎縮，越縮越小的毛囊讓頭髮無法再生。越是在毛囊萎縮的早期就開始治療，越有可能讓毛囊恢復，進而回到掉髮前的髮量。

主成分: 每ml含 Minoxidil 20mg

內容物:
- 三瓶落建生髮液 2% Minoxidil 60ml
- 內附二種使用器：
  按壓式噴頭 / 加長噴霧尖頭

注意事項:
- 僅可使用於18-65歲的掉髮者
- 心臟病患者，同時使用其他頭皮藥物者，使用前請先諮詢醫師或藥師
- 小心置放，遠離兒童。若不慎吞食，請立即就醫
- 僅能外用
- 可燃性；遠離火源

使用說明:
- 請先參考包裝內仿單再使用
- 每天兩次，每次使用1ml，均勻塗抹在落髮區的乾燥頭皮上
- 每天兩次並持續使用四個月是達到最佳生髮效果的方式
- 使用落建生髮液之前若要洗頭，可使用落建洗髮精徹底清潔頭皮，不阻塞毛囊也不傷害新生脆弱的頭髮

請上落建網站查詢更多生髮相關資訊：

www.regaine.com.tw

落髮分期

男性落髮分為七期，女性落髮分為三期，越早開始治療越有機會恢復落髮前的髮量。

第1期

第2期



輕度落髮

第3期

第4期

第5期



中度落髮

第6期

第7期



重度落髮

製造廠:
Contract Pharmaceuticals Ltd. Canada

製造廠地址:
7600 Danbro Crescent Mississauga, Ontario, Canada, L5N 6L6

藥商: 嬌生股份有限公司

藥商地址: 台北市大安區敦化南路二段319號4樓

消費者服務專線:
0800-094-567

有效期限及批號: 標示於盒底

請儲存於室溫攝氏15-25度

醫師藥師藥劑生指示藥品

衛署藥輸字第025698號


Regaine

13D

4 712818 292077

落建生髮液2% 60ml 3+1 6080939 121

LOT/MFG./EXP.:

0895CP
03/2015
02/2019

Regaine®

2% Extra Strength External Solution "Canada"

落建®

生髮液

臨床實驗證明

停止異常掉髮

鞏固髮根

再生新髮

2%

Minoxidil

加拿大廠

男女適用

基礎型

60ml 一個月用量

落建® 2%
生髮液

Minoxidil
加拿大籍

男女適用
基礎型

持續每天使用兩次
最快四個月
臨床實驗證明
可幫助男性及女性
再生新髮

三重作用

停止異常掉髮・鞏固髮根・再生新髮

要再生新髮，關鍵在於如何刺激毛囊將已萎縮的毛囊重新逐漸擴大，才能讓頭髮恢復生機。

多數的落髮起因於毛囊萎縮，越縮越小的毛囊讓頭髮無法再生。越是在毛囊萎縮的早期就開始治療，越有可能讓毛囊恢復，進而回到掉髮前的髮量。

主成分: 每ml含 Minoxidil 20mg

內容物:
- 一瓶落建生髮液 2% Minoxidil 60ml
- 內附二種使用器：
  按壓式噴頭/加長噴霧尖頭

注意事項:
- 僅可使用於18-65歲的掉髮者
- 心臟病患者，同時使用其他頭皮藥物者，使用前請先諮詢醫師或藥師
- 小心置放，遠離兒童。若不慎吞食，請立即就醫
- 僅能外用
- 可燃性；遠離火源

使用說明:
- 請先參考包裝內仿單再使用
- 每天兩次，每次使用1ml，均勻塗抹在落髮區的乾燥頭皮上
- 每天兩次並持續使用四個月是達到最佳生髮效果的方式
- 使用落建生髮液之前若要洗頭，可使用落建洗髮精徹底清潔頭皮，不阻塞毛囊也不傷害新生脆弱的頭髮

請上落建網站查詢更多生髮相關資訊：

www.regaine.com.tw

落髮分期

男性落髮分為七期，女性落髮分為三期，越早開始治療越有機會恢復落髮前的髮量。

第1期 	輕度落髮 
第2期 	
第3期 	中度落髮 
第4期 	
第5期 	
第6期 	重度落髮 
第7期 	



製造廠:
Contract Pharmaceuticals Ltd. Canada
製造廠地址:
7600 Danbro Crescent Mississauga, Ontario, Canada, L5N 6L6
藥商: 嬌生股份有限公司
藥商地址: 台北市大安區敦化南路二段319號4樓
消費者服務專線:
0800-094-567
有效期限及批號: 標示於盒底
請儲存於室溫攝氏15-25度
醫師藥師藥劑生指示藥品
衛署藥輸字第025698號


Regaine

13D

4

30024295

LOT/MFG./EXP.:

0905CP
03/2015
02/2019


Regaine
2% Extra Strength External Solution
落建®
生髮液
男女適用
基礎型


2%
Minoxidil
60ml 一餐共用量

每ml含Minoxidil 20mg
小心放置遠離兒童，避免接觸
儲存狀況: 儲存於室溫攝氏15-25度
注意事項: 請詳見仿單說明
使用說明: 請詳見仿單說明
製造商：Contract Pharmaceuticals
製造商地址：7600 Danbro Crescent,
Ontario, Canada
LOT
MFD
EXP


0895CP
03/2015
02/2019







Regaine®

Extra Strength External Solution "Canada"

落建®

生髮液

2%

Minoxidil

加拿大廠

男女適用

基礎型

落建 2% Minoxidil 生髮液

男女適用
基礎型

落建生髮液2% Minoxidil加拿大廠(男女適用)
衛署藥輸字第025698號　醫師藥師藥劑生指示藥品

成分：


每ml含：Minoxidil 20mg

性狀：

本品每ml含20mg Minoxidil，為末梢血管擴張劑，呈白色或灰白色無臭結晶固體可溶於水、丙二醇或乙醇，殆不溶於丙酮、氯仿或醋酸乙酯。

Minoxidil之化學名為2，4 pyrimidinediamine，6-(piperidinyl)-，3 oxide(分子量209.25)。

其化學式如下圖：



適應症：

雄激素性禿髮。

說明：

落建生髮液用於雄激素性禿髮者可刺激頭髮生長，防止落髮，男女皆適用。

藥理作用：

局部使用時，Minoxidil曾顯示可刺激雄激素禿髮者之頭髮生長。使用大約4個月或4個月以上(患者間各有不同)開始刺激毛髮生長。實驗證實，五人使用四人有效。停用落建生髮液後預估3~4個月間，新髮停止生長且恢復治療前舊觀。落建生髮液治療雄激素禿髮之確實作用機轉未明。局部使用落建生髮液，對於血壓正常者以及未治療之高血壓患者所作之對照性臨床實驗中，都未顯示出與吸收Minoxidil有關之全身性作用有關。

治療高血壓方面，口服Minoxidil有直接擴張末梢血管的作用，因減少末梢血管阻力而降低收縮壓及舒張壓。末梢小動脈阻力減低，血壓下降觸發交感神經性、迷走神經抑制性及腎恆常性機轉，包括腎活素分泌增加，導致心跳速率及心輸出量增高，鹽及水滯留。

Minoxidil不干擾血管運動性反射，故不引起立位性低血壓。於動物實驗中，本藥沒有明顯的藥量進入中樞神經系統。Minoxidil不影響人體的中樞神經系統功能。

人體藥物動力學：

局部使用落建生髮液後，Minoxidil很少被正常完整之皮膚吸收，平均總塗抹量之1.4%(範圍為0.3~4.5%)，最後會進入全身性循環。

而口服Minoxidil錠後，基本上會完全由胃腸道吸收。故1ml落建2% Minoxidil生髮液，給予皮膚

20mg Minoxidil，僅導致約0.28mg Minoxidil之吸收。1ml落建5% Minoxidil生髮液釋出50mg Minoxidil至皮膚可產生約0.7mg Minoxidil的吸收。患者若同時有皮膚疾病，其影響則仍未可知。

局部使用落建生髮液後，血清之Minoxidil濃度決定於皮膚吸收率。停止局部投予落建生髮液後，約95%全身性吸收之Minoxidil於4日內排出。

局部使用落建生髮液後所吸收之Minoxidil其代謝生物轉變尚未完全明瞭。

口服Minoxidil之主要代謝為在嘧啶環內N-oxide位置葡萄糖醛酸(glucuronic acid)結合，亦可轉變為更極化產物。已知之代謝物藥理作用遠低於Minoxidil本身。Minoxidil不與血漿蛋白結合，腎臟廓清速率與腎小球過濾率有關。Minoxidil不通過腦血管障壁。Minoxidil及其代謝物可由血液透析移除，主要由尿液排泄。

落建® 2% 生髮液 Minoxidil

男女適用
基礎型

用法用量：

僅供外用，須按指示使用。落建生髮液不可用於身上任何其他部位。總量1ml之落建生髮液由患部中心開始，使用於頭皮，每日兩次。此劑量與落髮範圍大小無關。每日總劑量為2ml。使用落建生髮液後，需徹底洗手。使用落建生髮液時，頭髮及頭皮需完全乾燥。

三重作用

停止異常掉髮．鞏固髮根．再生新髮

臨床實驗證明，持續每天兩次使用落建生髮液4個月，可使男性及女性頭髮再生。開始使用落建生髮液的前兩週，落髮現象可能持續，這是屬於正常暫時性的落髮現象。但如果使用3-4週後大量掉髮的現象還是持續，則請諮詢醫師或藥師。

落建生髮液2% 60ml(一個月用量)

塗抹方法因各種定量使用器不同，而有下列不同之塗抹方法：

A. 按壓式噴頭(Pump spray applicator)：

男：適用於大面積的落髮部位
女：適用於髮旋或髮際分線較寬部位

❶ 打開黑色大外蓋，移除內部之黑色瓶蓋。
❷ 將噴頭插於瓶上，並拴緊。
❸ 將噴頭對準頭皮上落髮之部位後，壓一下按壓式噴頭並以指尖將落建生髮液均勻塗抹至落髮區域。**重複按壓6次，共1ml，即為一次用量**。不用時蓋上黑色大外蓋。



B. 加長噴霧尖頭(Extend spray-tip applicator)：

男女：適用於小面積落髮部位

❶ 使用加長噴霧尖頭時，需置按壓式噴頭於瓶上（請參照按壓式噴頭步驟 ❶ 及 ❷）。
❷ 移去按壓式噴頭，將加長噴霧尖頭接於噴霧桿上，並向下壓緊。打開加長噴霧尖頭之小蓋。
❸ 將噴頭對準頭皮上落髮部位後，壓一下噴頭並以指尖將落建生髮液均勻塗抹至落髮區域。**重複按壓6次，共1ml，即為一次用量**。不用時蓋上小蓋。



儲存狀況：

儲存於室溫攝氏15~25度。請注意外盒之有效期限。

禁忌：

落建生髮液禁用於已知對Minoxidil，或任何其他成份過敏之患者。

副作用：

在一項以5% Minoxidil和2% Minoxidil生髮液以及安慰劑的比較研究顯示，皮膚變化在5% Minoxidil這一組較常發生，而這種變化在5%和2%二組具相似性和嚴重程度，但在5%組有較高的發病率。

臨床試驗中，落建生髮液最常見之副作用為頭皮輕微的皮膚炎。不常見之副作用，包括刺激性皮膚炎(發紅、鱗屑剝落，和灼熱感)。非特異性過敏反應，蕁麻疹，過敏性鼻炎，面部腫脹，敏感，呼吸急促，頭痛，神經炎，頭眼昏花，頭重腳輕，昏厥，眩暈，水腫，胸痛，心悸，血壓改變，和心搏率改變。罕見之副作用，包括過敏性、接觸性皮膚炎，毛囊炎，禿髮，非預期性的毛髮病和皮脂漏。

除輕微皮膚變化外，前述副作用與使用落建生髮液間之因果關係尚未確立。

使用落建前請特別注意：

考慮採用落建生髮液治療的病人需先問過病史及做過健康檢查，醫師需檢查確定病人的頭皮正常。雖然使用落建生髮液徹底進行臨床試驗，未曾顯示吸收足量Minoxidil，足以引致全身性效應，但皮膚確實會吸收部分Minoxidil，故可能出現全身性作用，例如鹽、水滯留，全身性與局部性水腫，心包滲液，心包炎，心包填塞，心絞痛，心跳快速，或

加重因guanethidine所引起的立位性低血壓。有潛在心臟病病史之病人須瞭解落建可能使病情加重。須定期注意病人是否有任何全身作用的徵兆。若出現全身性副作用則停藥。必要時，可以利尿療法處理液體滯留和水腫。可用ß交感神經阻斷劑或其他交感神經系統抑制劑控制心跳過速和心絞痛。患者若出現全身性作用或嚴重皮膚反應時須停用落建生髮液並與醫師聯絡。

落建生髮液會使眼睛灼熱、刺激。不慎與敏感體表(眼睛，擦傷之皮膚，黏膜)接觸時，須以大量冷水沖洗。

誤食落建生髮液會造成嚴重副作用。叮嚀患者將此藥及所有藥物置於兒童不能觸及之處。落建生髮液對同時患有皮膚病或使用外用腎上腺類皮質素或其他皮膚製劑之患者的作用不明。

用於兒童：

落建生髮液用於18歲以下患者之安全性及有效性尚未建立。

用於老人：

落建生髮液用於65歲以上患者之安全性及有效性尚未建立。

用於懷孕及授乳期：

依文獻記載。落建生髮液用於孕婦之作用未明。全身性吸收之Minoxidil會由人類乳汁排出。女生孕婦或授乳婦不可使用落建生髮液。

落建 生髮液 2% Minoxidil

男女適用
基礎型

交互作用：

目前尚無已知與使用落建生髮液有關之藥物交互作用。雖無臨床實驗證明，但同時服用末梢血管擴張劑的患者有加強立位性低血壓之可能性。

適量及誤食：

誤食可能產生與Minoxidil之血管擴張作用有關之全身性效應。

藥物過量之徵兆和症狀最可能者為心臟血管作用及伴有液體滯留，血壓降低及心跳過速，液體滯留可以適當之利尿療法處理。心跳過速可投予β交感神經阻斷劑控制。症候性低血壓可靜脈注射生理食鹽水加以治療。擬交感神經藥物如norepinephrine及epinephrine具有過度刺激心臟之作用，應避免使用。

造型注意事項：

1.使用落建生髮液無須改變原本使用其他造型品的習慣（定型噴霧、慕絲、髮膠等）。可以在使用落建生髮液後，待頭髮乾燥，再使用其他造型髮品，且盡量避免塗抹於頭皮上。

2.目前並無資訊顯示染髮、燙髮或使用直髮調整劑會影響落建生髮液的效果。但為了避免刺激頭皮，在使用染、燙等化學藥劑當天請暫停使用落建生髮液。在頭皮清潔乾淨後，再回復1天2次使用落建生髮液。

3.使用落建生髮液後4小時內要避免頭皮碰水(如游泳、洗頭、淋雨等)，以確保達到最佳效果。

製造廠：Contract Pharmaceuticals Ltd. Cornwall
製造廠地址：7600 Danbro Crescent Mississauga
Ontario, Canada, L5N 6L6
藥商：媽生股份有限公司
地址：台北市大安區敦化南路二段319號4樓
電話：0800-094-567

13D