切り口 **この袋は使用直前まで開封しないでください。** 切り口

アミノ酸の結晶析出やビタミンの分解の原因となります。

11854120628

使用期限 2013.12　製造番号 K2F96

販売提携 大塚製薬株式会社 東京都千代田区神田司町2-9
製造販売元 株式会社大塚製薬工場 徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115

注意－医師等の処方せんにより使用すること

中心静脈 点滴専用

3室液混合

遮光・室温保存

NEOPAREN® No.1 Injection

高カロリー輸液用　糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン液

ネオパレン® 1号輸液 1000mL ×1袋

■上室液組成(300mL中)

L-ロイシン	2.80 g
L-イソロイシン	1.60 g
L-バリン	1.60 g
L-リシン酢酸塩	2.96 g
L-トレオニン	1.14 g
L-トリプトファン	0.40 g
L-メチオニン	0.78 g
アセチルシステイン	0.27 g
L-フェニルアラニン	1.40 g
L-チロシン	0.10 g
L-アルギニン	2.10 g
L-ヒスチジン	1.00 g
L-アラニン	1.60 g
L-プロリン	1.00 g
L-セリン	0.60 g
グリシン	1.18 g
L-アスパラギン酸	0.20 g
L-グルタミン酸	0.20 g
酢酸カリウム	0.649 g
クエン酸ナトリウム水和物	0.360 g
ニコチン酸アミド	20 mg
葉酸	0.2 mg

■小室液組成(4mL中)

リボフラビンリン酸エステルナトリウム	2.3 mg
アスコルビン酸	50 mg
ビオチン	30 μg
ビタミンA油	1650ビタミンA単位
コレカルシフェロール	2.5 μg
トコフェロール酢酸エステル	5 mg
フィトナジオン	1 mg

■下室液組成([illegible]mL中)

ブドウ糖	120 g
塩化ナトリウム	2.690 g
酢酸カリウム	0.521 g
リン酸二カリウム	0.880 g
塩化カルシウム水和物	0.294 g
硫酸マグネシウム水和物	0.493 g
硫酸亜鉛水和物	5.76 mg
チアミン塩化物塩酸塩	1.95 mg
ピリドキシン塩酸塩	2.45 mg
シアノコバラミン	2.5 μg
パンテノール	7 mg

■混合時(1000mL中)

Na^+	50 mEq
K^+	22 mEq
Mg^{2+}	4 mEq
Ca^{2+}	4 mEq
Cl^-	50 mEq
SO_4^{2-}	4 mEq
$Acetate^-$	47 mEq
$Citrate^{3-}$	4 mEq
P	5 mmol
Zn	20 μmol
ブドウ糖	120g
総遊離アミノ酸量	20g
総熱量	560kcal
非蛋白熱量	480kcal
非蛋白熱量/窒素	153
pH	約5.6
浸透圧比	約4

(01)04987035198116

総熱量 560kcal
非蛋白熱量 480kcal

●ご注意

1. この袋は酸素と光を遮断し、アミノ酸の結晶析出やビタミンの分解を防止します。
2. この袋の内側に封入している脱酸素剤は絶対に服用しないでください。そのまま廃棄してください。
3. この袋を開封したものは速やかにご使用ください。
4. 温度変動により、上室液にアミノ酸の結晶が析出することがありますが、この場合は常温(15～25℃)付近で振とうすることにより溶解して使用できます。
5. 次の場合には使用しないでください。
   ①この袋が破損しているとき。
   ②この袋の内側に水滴や内容液の漏出が認められるとき。
   ③黄褐色の小室(ビタミン液)が破れ、上室液が黄色に着色しているとき。
   ④上室液と下室液を分離している隔壁が万一開通しているとき。
   ⑤内容液に混濁や変色又は振とうで溶解しない[illegible]が認められるとき。
6. 使用時に[illegible]隔壁を開通し、3室の液をよく混合してください。
7. [illegible]はゴム栓の[illegible]まっすぐ刺してください。

9504

ネオパレン1号輸液 ネオパレン1号輸液 ネオパレン1号輸液 ネオパレン1号輸液 ネオパレン1号輸液 ネオパレン1号輸液 ネオパレン1号輸液 ネオパレン1号輸液