

~有效緩解眼睛疲勞、眼睛紅、維生素氨基酸添加~

晶清眼藥水

衛署藥輸字第025732 號

Eyerich α

「晶清眼藥水」含有 Neostigmine、緩解眼睛疲勞的 Chondroitin、緩解發炎症狀的 Glycyrrhizinate 及 ϵ -Aminocaproic acid、幫助緩解眼睛血管腫脹的 Tetrahydrozoline、配合維生素 B6、氨基酸及 Aspartate 等 8 種有效成份，緩解眼睛不適。

■有效成分 Each mL contains:

Tetrahydrozoline hydrochloride	0.5 mg
Neostigmine methylsulfate	0.05 mg
ϵ -Aminocaproic acid	10.0 mg
Dipotassium glycyrrhizinate (甘草淬取物)	2.5 mg
Pyridoxine hydrochloride (Vit.B6)	0.5 mg
Potassium and magnesium L-aspartate (equal mixture)	20.0 mg
Taurine (牛磺酸)	4.0 mg
Chondroitin sulfate sodium (軟骨素)	3.0 mg

■賦形劑成分:

Disodium Edetate Hydrate、Boric Acid、*d*-Camphor、*d*-Borneol、*l*-Menthol、Benzalkonium Chloride Solution(10%)、Chlorobutanol、Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil 60、Purified Water

■適應症 暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、或眼睛紅，眼睛疲勞。

■用法、用量 一天 3 至 6 次，每次 1 至 2 滴。

醫師藥師藥劑生指示藥品

注意事項

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。(25°C以下)
3. 使用前，請洗淨雙手。
4. 請依照藥品標示使用。
5. 過期眼藥水，請勿使用。瓶裝之眼藥水，開瓶 30 天後請勿繼續使用。
6. 藥液混濁、變色或出現異物時請丟棄。
7. 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口。
8. 使用兩種眼藥水時，請隔開至少 5 分鐘後點藥。
9. 使用兩種眼藥時，請先使用藥水再用藥膏；並請隔開至少 10 分鐘後點藥。

警語

1. 以下情況應停藥立即就醫：
 - (1) 連續使用三天(或 72 小時)症狀未解除。
 - (2) 使用後產生眼睛劇痛、視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
 - (3) 發生過敏反應。
 - (4) 青光眼(Glaucoma)患者。
2. 對本藥之主要成分、防腐劑或其他賦形劑過敏者，不推薦使用。
3. 正在接受醫師治療或醫師處方眼藥之患者，不應自行購買使用。
4. 本藥含血管收縮劑，過度使用會增加眼睛紅腫。
5. 青光眼患者，除非經醫師指示，否則不要使用含血管收縮成分之製劑。

儲存條件：25°C以下儲存

包裝：100 毫升以下塑膠瓶裝

製造藥廠

SAGA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

481 KOKURA, OAZA, KIYAMA-MACHI, MIYAKI-GUN, SAGAKEN, JAPAN

進口藥商

順仁西藥行

新北市中和區中山路 2 段 312 巷 12 號