
切り口
この袋は使用直前まで開封しないでください。
アミノ酸の結晶析出やビタミンの分解の原因になります。
切り口
2014.2
販売提携 大塚製薬株式会社
東京都千代田区神田司町2-9
製造販売元 株式会社大塚製薬工場
徳島県鳴門市瀬戸町立岩字芥原115
注意一医師等の処方せんにより使用すること
NEOPAREN® No.2 Injection
高カロリー輸液用 糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン液
中心静脈
3室液混合
遮光・室温保存
ネオパレン® 2号輸液
1500 mL ×1袋
■上室液組成(450mL中)
L-ロイシン 6.30 g
L-イソロイシン 3.60 g
L-バリン 3.60 g
L-リシン酢酸塩 6.66 g
L-トレオニン 2.565 g
L-トリプトファン 0.90 g
L-メチオニン 1.755 g
アセチルシステイン 0.60 g
L-フェニルアラニン 3.15 g
L-チロシン 0.225 g
L-アルギニン 4.725 g
L-ヒスチジン 2.25 g
L-アラニン 3.60 g
L-プロリン 2.25 g
L-セリン 1.35 g
グリシン 2.655 g
L-アスパラギン酸 0.45 g
L-グルタミン酸 0.45 g
酢酸カリウム 1.191 g
クエン酸ナトリウム水和物 0.690 g
ニコチン酸アミド 30 mg
葉酸 0.3 mg
■小室液組成(6mL中)
リボフラビンリン酸エステルナトリウム 3.45mg
アスコルビン酸 75 mg
ビオチン 45 μg
ビタミンA油 2475ビタミンA単位
コレカルシフェロール 3.75μg
トコフェロール酢酸エステル 7.5 mg
フィトナジオン 1.5 mg
■下室液組成(1044mL中)
ブドウ糖 262.5 g
塩化ナトリウム 3.945 g
酢酸カリウム
リン酸二
塩化カルシウム水和物 0.5
硫酸マグネシウム水和物 0.930 g
硫酸亜鉛水和物 8.64 mg
チアミン塩化物塩酸塩 2.925mg
ピリドキシン塩酸塩 3.675mg
シアノコバラミン 3.75 μg
パンテノール 10.5 mg
■混合時(1500mL中)
Na+ 75 mEq
K+ 41 mEq
Mg2+ 7.5mEq
Ca2+ 7.6mEq
75 mEq
8 mE
Acetate−
Citrate3− 18 mEq
Succinate2− 18 mEq
P 9 mmol
Zn 30 μmol
ブドウ糖 262.5g
総遊離アミノ酸量 45g
総熱量 1230kcal
非蛋白熱量 1050kcal
非蛋白熱量/窒素 149
pH 約5.4
浸透圧比 約5
(01)04987035185215
●ご注意
1. この袋は酸素と光を遮断し、アミノ酸の結晶析出やビタミンの分解を防止します。
2. この袋の内側に封入している脱酸素剤は絶対に服用しないでください。そのまま廃棄してください。
3. この袋を開封したものは速やかにご使用ください。
4. 温度変動により、上室液にアミノ酸の結晶が析出することがありますが、この場合は常温(15～25℃)付近で振とうすることにより溶解して使用できます。
5. 次の場合には使用しないでください。
①この袋が破損しているとき。
②この袋の内側に水滴や内容液の漏出が認められるとき。
③黄褐色の小室(ビタミン液)が破れ、上室液が黄色に着色しているとき。
④上室液と下室液を分離している隔壁が万一開通しているとき。
⑤内容液に混濁や変色又は振とうで溶解しない結晶が認められるとき。
6. 使用時に必ず隔壁を開通し、3室の液をよく混合してください。
7. 注射針はゴム栓の○印にまっすぐ刺してください。
総熱量1230kcal
非蛋白熱量1050kcal
9565