

抗痛寧

舒布

CONTONLIN Plaster



開封後請速密封 →

《 特 點 》

- 本品適用於關節痛、肌肉痛症狀。貼於患部，具清涼感，為鎮痛巴布劑。
- 本品採用高含水性基劑，能使患部產生冷卻效果而滲入皮下組織。

《 成 分 》有效成分及含量：Each 16g (10cm×14cm) contains：

L-Menthol.....144mg

DL-Camphor.....160mg

Methyl Salicylate.....160mg

其他成分(賦形劑)：

Purified Water, Glycerin, PVA Solution, Sorbitol Solution, Sodium Polyacrylate, Nikasol TS-620, Carboxymethylcellulose Sodium, Kaolin, Sodium Polyacrylate Starch, Tween 80, Nonion OP-80R, Titanium Dioxide, Tartaric Acid, Aerosil 200

《 用途(適應症) 》腰痛、打撲、捻挫、肩膀痠痛、關節痛、肌肉痛、肌肉疲勞。

《 不得使用族群 》對本藥成分過敏者(包含藥成分與賦形劑成分)、曾經對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象者。

《 用法用量 》

| | |
|----|--|
| 次數 | 依患部症狀給予適當增減使用，次數通常一日1~2次貼於患部。 |
| 方式 | 流汗時，請先將患部擦乾再予貼上。 於關節等易脫落之部位，可用黏著性膠帶或伸縮繃帶固定。 |



PR-13188TWAC

《 使用上注意事項 》

1. 有下列情形者，請勿使用：(a)對本藥成分引起過敏的人。(b)曾經對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象者。
2. 有下列情形者，請洽醫師診治：(a)有深部皮膚組織感染。
3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師或藥師藥劑生：(a)兩歲以下兒童。(b)對藥物或化粧品等有產生過敏者(例如發疹、潮紅、搔癢、癢疹)。
4. 其他使用上注意事項：(a)嚴守使用方法。(b)兒童須在保護者指導監督下，才可使用。(c)本品應置兒童不易拿到之處。(d)Methyl Salicylate不可長期大面積使用，以免引起水楊酸中毒症狀，如呼吸困難、發汗、體溫過高、面潮紅、持續性耳鳴、劇烈或持續頭痛，使用前請諮詢醫師或藥師。

《 警 語 》使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

| 身體部位 | 副作用 |
|------|-------------------------------|
| 皮膚 | 皮膚灼熱感、刺痛、紅斑、發疹、潮紅、搔癢、癢疹。 |
| 其他 | 水楊酸反應(耳鳴、暈眩、噁心、嘔吐等)、滯鼻、刺激性咳嗽。 |

使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (1)若有上述之其他不適情況發生。
- (2)使用7天後，自覺狀況沒有改善或惡化。

《 類 別 》醫師藥師藥劑生指示藥品。

《 包 裝 》16g (10cm×14cm)/鋁箔袋裝。9.6g (6cm×14cm)/鋁箔袋裝。

《 儲存條件 》儲存於30°C以下。 《 諮詢專線 》0800000658

衛署成製字第010319號G.M.P G-5833 藥商、製造廠/ 得生製藥股份有限公司二廠
台南市永康區環工路42-1號

製造批號/
保存期限/

總經銷/ 三正貿易有限公司
臺北市洛陽街9號9樓之9

成藥