- 在眼睛內點用藥物前，先通知裝配人員。
- 病人應告知雇主，他是隱形眼鏡配戴者。有些工作可能需要配戴護眼罩，或不適合配戴隱形眼鏡。
- 與任何隱形眼鏡一樣，追蹤檢查可以確定病人的眼睛健康。病人應被告知建議的追蹤檢查時間。

不良反應：

病人應被告知，以下可能發生的問題：

- 眼睛刺、灼熱、發癢（刺激感）、或其他眼睛痛
- 鏡片戴上眼睛後，舒服感減低
- 眼睛有異物感（異物、刮傷）
- 眼睛過量流淚
- 異常眼睛分泌物
- 眼睛紅
- 視力敏銳度降低（最佳視力變差）
- 視力模糊，物體旁呈彩虹或光環
- 畏光（對光線敏感）
- 眼睛乾燥

如果病人注意到異上情況，應被指示：

- 立刻取下鏡片
- 如果不舒適或問題停止，仔細的檢查鏡片。如果鏡片有任何損壞，不要再戴上眼睛。把鏡片放回鏡盒內，然後通知裝配人員。如果鏡片上有髒東西、睫毛或其他異物，或者問題停止了而鏡片看不出有任何問題，病人應戴上新的鏡片。戴上新鏡片後，如果問題繼續發生，病人應立刻取下鏡片，然後磋商裝配人員。

如果以上症狀取下鏡片後、或者戴上新鏡片後仍繼續，病人應立刻取下鏡片，然後磋商裝配人員或醫生；他會決定是否需要檢查、治療或提交專家處理。（請看不良反應之重要治療資訊）。嚴重的情況，如感染、角膜潰瘍、角膜新生血管、或虹膜炎可能會發展得很快。較不嚴重的反應，如磨損、上皮刺痛或細菌性結膜炎，必須小心處理及治療，以避免更嚴重的併發症。

不良反應之重要治療資訊

隱形眼鏡相關威脅視力的眼睛併發症，可能發展得很快，所以早期的診斷及治療是非常重要的。感染性角膜潰瘍，是其中最嚴重的潛在併發症之一，可能早期症狀含糊。感染性角膜潰瘍的體癥及症狀，包括不舒適、痛、發炎、膿狀分泌物、畏光、前房反應及角膜浸潤。

輕微的角膜磨損最初的症狀，和早期的感染性潰瘍相似。如果這樣的上皮缺陷，