劇

〝濟生〞 新斯狄格明 注射液
NEOSTIGMINE INJ. 〝CHI SHENG〞

成　　分 Each ml contains:
主成分
Neostigmine Methylsulfate……0.5 mg
賦形劑
Sodium Acetate $3H_2O$、Sodium Bisulfite、Sodium Chloride、Water for injection

作　　用 Neostigmine有興奮副交感神經的作用，因而對腸管，肌肉麻痺的治療很有效。

適 應 症
1. 各種腸管麻痺及排尿困難。
2. 由於肌無力、肌肉麻痺、腦溢血、小兒麻痺、神經痛、關節痛等引起之各種運動障礙。
3. 眼肌無力症、綠內障、瞳孔反應檢查。

用法用量 通常1日1次，每次1mL作肌肉注射，依年齡、症狀反應而由少量漸增為每次3mL或一日數次，每次1mL反覆注射。
本藥限由醫師使用

包裝・儲藏 1毫升玻璃安瓿，100支以下盒裝。
本藥應避光儲存於25℃以下。

內衛藥製字第000337號

CHI SHENG
濟生醫藥生技股份有限公司
CHI SHENG PHARMA & BIOTECH CO., LTD.
新竹縣湖口鄉勝利村實踐路3號
電話：（03）5983811

3315-04