

精神·神經安定劑


# 大益糖衣錠5公絲

## TAAE S.C. TABLETS 5mg

內衛藥製字第001503號

**【來歷】**本劑係由瑞士Roche研究所經多年研究而創製，嗣於1959年由Bowes、Farbe、Randall諸氏加以研究，並經動物實驗及依據2萬例之臨床實驗結果認明，對於解消不安及緊張具有優異效果，且具有抗抑鬱及抗痙攣作用，並以Librium(Roche)之商品名而製售。

**【組成】**每錠中含有：Chlordiazepoxide HCl.....5mg  
本劑之化學構造式如下：



**【化學式】** 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1, 4-benzodiazepine-4-oxide HCl

**【賦形劑】** Brilliant Blue FCF、Carnauba Wax、Calcium Phosphate Dibasic、Corn Starch、Gelatine、Hydroxypropyl Cellulose L、Hydroxypropyl Methylcellulose 615、Hydroxypropyl Methylcellulose phthalate 55、Lactose Monohydrate、Magnesium Stearate、Povidone K30、Propylenoxide Ethyleneoxide Co-polymer、Sucrose、Talc、Titanium Dioxide

**【性狀】** 白色之結晶性粉末，易溶於水、醇(Alcohol)，mp：212~218°C（分解）。

**【作用】** 據Randall報告，本劑對於動物實驗並無發生鎮靜或抑制運動等情形，且對不穩之動物具有能使其溫和之作用，此種作用比Meprobamate為強，而且無Chlorpromazine、Reserpine所常見之自律神經遮斷作用。對於Pentetrazol痙攣之拮抗作用，亦比Meprobamate、Chlorpromazine、Phenobarbital為強，對於電氣痙攣之防止作用仍比Meprobamate、Chlorpromazine為強，但殆無催眠作用，脊髓反射約Meprobamate之1/10量就可抑制，雖具有食慾亢進作用但是並無Monoamine Oxidase阻害作用，又對於循環系統殆無作用。LD<sub>50</sub>對Mouse，Rat各為750mg/kg，2,000mg/kg。據Harris、Rosensteins氏報告，本劑之基本作用乃特別對於解除不安及緊張具有優異效果，又能消除焦慮、恐怖、強迫狀態，並且具有顯著之抗抑鬱作用。本劑以治療精神障害為中心，然而對其對象之適應範圍甚廣，並可謂包含Meprobamate、Phenothiazin系作用之一部份。對於慢性毒性之反應：以本劑使Rat及狗連續服用不但其毒性甚微且能增進食慾，故顯示良好之成長率，僅經發現其輕度之運動失調及腹瀉等情形，惟雖經一年間之口服並未發現其有組織學變化及生殖機能之異常。

**【臨床藥理】** 精神科範圍：對於精神不安、神經症、神經衰弱、癱病(Hysteria)、強迫神經病、神經質、抑鬱反應等，一般常見之不安、緊張、焦急感、心氣震動具有著效，不眠，於服用數日後即可消除，且從來被認為難治之恐怖狀態之病患，強迫觀念及行為等亦能緩解，而且使大多數抑鬱狀態之病患能產生幸福感，對於社會活動增加興趣，多言，增進食慾並發現其解消抑鬱等情形，對於癲癇發作，癲癇性格，並無如從來服用抗癲癇藥劑時所見之精神症狀之惡化及意識混濁，且能同時改善其發作及性格變化者為多。其他鬱病尤其是激越性鬱病及精神分裂症，特別於初期所常見之不安、緊張之解除，或Alcohol中毒之不安、緊張、振顫譫妄，頭部外傷後遺症所常見之神經衰弱樣症狀有效果。

內科範圍：慢性疾患所附帶之不安神經症狀有著效。

婦產科範圍：對於月經前之不安、緊張，更年期障害，分娩初期不安、興奮狀態等能奏效，因月經困難之疼痛，服用本劑亦可消除。

其他：手術前後之不安、緊張之消除。

**【適應症】** 焦慮狀態，急性酒精戒斷症候群。

**【用法，用量】** 成人：1次2錠，1日服用2~3次，視症狀1日量可增至12~18錠分3~4次服用。

小兒：劑量視年齡酌減。本藥須由醫師處方使用。

**【注意事項】** 1)服用本劑時請勿飲酒。

2)老年人如患有嚴重之心臟病者，如需服用本劑，應請醫師特別指示。

3)使用本藥品時併服葡萄柚或葡萄柚汁時，應注意可能產生的藥品相互作用。

**【警語】** 依據隨機分派，有對照組的臨床試驗 (Randomized controlled trial, RCT) 臨床試驗及回溯性世代研究 (Retrospective cohort study) 發現，抗精神病藥品，包括傳統 (Conventional) 與非典型 (Atypical) 之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患 (dementia-related psychosis) 的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性較高。

**【包裝】** 100錠；500錠；1,000錠 塑膠瓶裝。



強生化學製藥廠股份有限公司

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.

新北市241三重區三和路四段77、79號

訂貨專線：(02)29894756 FAX：(02)29712579

工廠電話：(02)22878405

Code No. : G-22