

風擋膠囊

Fondan Capsules

傷風感冒為人們最易患的疾病，一般傷風感冒是由細菌或病毒的感染，寒冷刺激或過敏性反應等種種原因，而引起複雜的症狀。所以治療傷風感冒，僅用單種藥劑不易治療，唯有合併對於各種傷風感冒症狀，有效的藥物，發揮綜合效果，才能達到最好的治療目的。

本藥採用優良的解熱鎮痛藥Acetaminophen、Ethoxybenzamide及抗組織胺劑Chlorpheniramine Maleate，且加入擴張支氣管的dl-Methylephedrine HCl，使腦部血流舒暢的Caffeine及維生素B₁等配成治療藥物。

【成分】有效成分及含量：EACH CAPSULE CONTAINS:

Acetaminophen150mg
Ethoxybenzamide250mg
dl-Methylephedrine HCl16.6mg
Chlorpheniramine Maleate...2.5mg
Thiamine HCl15mg
Caffeine25mg

其他成分(賦形劑)

Lactose、Potato Starch、0號紅-白色硬空膠囊(Gelatin、Purified Water、Glycerine、Sodium Lauryl Sulfate、New Coccin、Brilliant Blue FCF、Titanium Dioxide)

【用途(適應症)】緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛)。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 - (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
 - (二) 有蠶豆症的人。
 - (三) 懷孕28周以上的婦女。
 - (四) 18歲以下之水痘或流行性感症之解除。因其可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (一) 12歲以下兒童。
 - (二) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
 - (三) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
 - (四) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
 - (五) 有心臟病及65歲以上的人。
 - (六) 有消化性潰瘍或正使用抗凝血劑的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑師：
 - (一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (二) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
 - (三) 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
 - (四) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
 - (五) 曾有消化性潰瘍的人。

四、其他使用上注意事項：

- (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二) 避免陽光直射。
- (三) 勿超過建議使用量。
- (四) 不要服用本藥超過七日。
- (五) 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
- (六) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，有急性肝衰竭及胃出血的風險。
- (七) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
- (八) 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心悸過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

年齡	每日使用量
成人	1日3次，每次1粒，飯後服用

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑師：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
- (三) 症狀沒有改善，或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
- (四) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
- (五) 服用過量【每日超過Acetaminophen4,000毫克(mg)】，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
- (六) 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】6~1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【類別】醫師藥劑師指示藥品。



美西製藥有限公司
高雄市仁武區仁武里工業一路九號

