

局部麻醉劑

“信東” **鹽酸普魯卡因** 注射液 1%、2%  
**Procaine HCl Injection 1%、2% “S.T.”**

Procaine HCl 是目前最廣用之局部麻醉劑，因其表面滲透力弱，因此只能用作注射麻醉而不宜作表面麻醉，不過本品之毒性為一般局部麻醉劑中最低者。沒有 Cocaine 成癮的弊病。對瞳孔和血管沒有作用，是一種相當安全之局部麻醉劑，具有下列之化學構造：



通常 Procaine HCl 注射液與適量之腎上腺素(Adrenaline)配合使用，以延緩其吸收，增進止血作用，減低其毒性，增長麻醉時間。

**【成分】**

每 ml 含有：

Procaine HCl Injection	1.0%	2.0%
Procaine HCl	10mg	20mg

本藥含賦形劑 Sodium Chloride、Water for Injection。

**【適應症】**

局部麻醉用。

**【用法·用量】**

浸潤麻醉時用 0.25~0.5% 之溶液，神經阻滯時用 1~2% 之溶液。1 日最大量不得超過 100mg。

本藥限由醫師使用。

**【注意事項】**

本藥類似 amide-Type 局部麻醉劑，會引起嚴重過敏反應。

**【包裝】**

1.0% 內衛藥製字第 002996 號

玻璃安瓿：10ml × 100, 2ml, 20ml, 30ml

玻璃瓶：50ml, 100ml

2.0% 內衛藥製字第 002992 號

玻璃安瓿：10ml × 100, 2ml, 20ml, 30ml

玻璃瓶：50ml, 100ml



信東生技股份有限公司  
桃園市介壽路 22 號