

標籤

<p>【用法用量】 成人 — 淋病及尿道感染症：治療量每次 2 錠，一日 3 次，通常約需 1 週(重症時可能需 2 週之久)爾後改為維持量直至治癒為止，維持量為每次 0.5gm、每日 3 次。 腸道感染症：每次 0.5 ~ 1gm、一日 3 次(通常僅需 1 ~ 2 日即可)。 孩童 — 無論各感染症，其治療量按一日量 25 ~ 50mg/kg 分 2 ~ 4 次服用，維持減半，惟應按其發育情形酌予加減(14 歲以上按成人量服用)。 內衛藥製字第 005508 號。 本藥須由醫師處方使用。</p>	<p style="text-align: center;">“福元” 納利淨錠 0.5 克</p> <p style="text-align: center;">Nalidin Tablets 0.5Gm “F.Y.”</p> <p> 福元化學製藥股份有限公司 新北市瑞芳區大寮路 95-1 號</p>	<p style="text-align: right;">1000 錠</p> <p>【適應症】 尿道炎、膀胱炎、腎盂炎、前列腺炎、尿道炎術引起之感染、急性慢性淋病、細菌性病疾、腸炎膽囊炎、膽管炎。 【注意事項】請詳閱說明書。</p> <p>製造批號： 保存期限：</p> <p style="text-align: right;">LA-T066</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center;">條 碼</div>
---	--	---