

蛋白同化荷爾蒙

“青葉” 瑪樂蒙注射液

MACRABONE INJ. “G.L.”

內衛藥製字第 010003 號

「組成」:本劑每ml 中含有

Nor-androstrenolone phenylpropionate 25mg, 無痛性的油溶性注射液。

[作用]:

1. 促進人體組織蛋白合成作用, 蛋白同化作用比 Testosterone Propionate 還強 12 倍。
2. 對鈣質有優良的沈著作用:對蛋白合成作用之外, 尚對脫鈣化的骨組織具有促進鈣質沈著作用, 所以對促進骨形成亦有效果。
3. 有持續性的效果:每回的筋肉注射僅需 25mg, 則可保持 1~2 星期之藥效。

「效果」:

本劑對於下列各症具有優秀的效能。

1. 外傷、手術後:使用本劑能有效的利用蛋白質, 促進肉芽的新生, 快癒創傷。
2. 骨形成不全、骨疏鬆症、骨折:使用本劑對骨組織能充分補給蛋白質的結果, 二次的促進鈣的沈著, 導致早期恢復。

[適應症]:

骨骼疏鬆症(Osteoporosis), 男性性腺機能不足症(Hypogonadism), 手術後、外傷、熱傷、慢性腎臟疾病引起之體質極度消耗, 再生不良性貧血引起之骨髓消耗狀態。

「注意事項」:

1. 使用前醫師應切實權衡其利弊, 如另有代替使用之藥品避免使用。
2. 本劑宜避免大劑量或長期服用。
3. 孕婦長期服用該藥可能導致女性胎兒男性化, 故已懷孕或可能懷孕之婦女避免使用。

4. 對於小兒會引起骨骼之早期閉鎖(Premature Closure of the epiphyses)及性早熟等現象, 故應十分慎重觀察投與, 十二歲以下小孩避免使用。

5. 對於前列腺肥大、心臟、腎臟疾病患者, 癌的骨轉移患者及高齡者(鈉或體液滯留, 高鈣血症者)糖尿病患者, 應慎重投藥, 肝臟機能障害者, 禁用本劑。

6. 服用本劑會有黃疸現象, 將導致 GOT GPT 之上昇, 長期投藥, 應做定期肝功能檢查, 若發現有異常者, 即停止給藥。

7. 如有下列症狀出現時, 應立即中止投藥。(a) 女性:聲音低沈, 多毛, 色素沈著, 月經異常, 陰核肥大, 性慾亢進。(b) 男性: 瘡瘡, 陰莖肥大、陽萎, 持續性勃起, 甚至精子減少, 精液減少等, 睪丸機能抑制現象。

8. 有過敏現象者, 應立即中止給藥。

9. 服用本藥會導致噁、嘔吐, 食慾不振, 便秘, 下痢等胃腸障害以及頭痛, 頭暈, 興奮, 不眠之精神經系統障礙。

「用法用量」:

本藥限由醫師使用。

成人:通常一星期或隔一星期注射一回 25mg 於肌肉內
2~13 歲:12.5~25mg/2-4 星期注射一次。

[包裝]:

25mg 1mlx, 50Vials. 50mg

2mlx, 50Vials. 100Vials.

製造廠 :大豐製藥股份有限公司

彰化市延平里岸頭巷 11 號

總經銷 :青葉化學廠有限公司

台南市中山路 33 號