

# “信東”氯黴素-S 注射液

## Chloramphenicol-S Injection

氯黴素是一種廣範圍抗菌性之抗生素，早為美國藥典(U.S.P.)所收載，對一般革蘭氏陽性及陰性菌立克次氏小體，螺旋體菌及大型病毒都有強力之抗菌作用。本劑為水性懸濁氯黴素製劑。係將微粒化氯黴素均勻分散懸濁於注射用水中而成安定水性懸濁劑。專供肌內注射，為達無痛之目的，添加局部麻醉劑鹽酸利多卡因。使用簡便可隨時取用必要份量分次使用。以注射液之劑型，最適合下列情況使用。

1. 必要發揮急速治療效果時。
2. 有嘔吐，下痢現象，由腸管吸收不充分時。
3. 因症狀或年齡而經口投與有困難時。

### 【成 分】

主成分：本劑每ml中含有

Chloramphenicol	250mg (力價)
Lidocaine HCl	5mg

賦形劑：Carboxymethylcellulose Sodium、Methyl Paraben、Methyl Cellulose、Polyvinyl Pyrrolidone、Propyl Paraben、Sodium Phosphate Dibasic 12H<sub>2</sub>O、Sodium Phosphate Monobasic 2H<sub>2</sub>O、Tween 80、Water for Injection。

### 【特 長】

1. 本劑為無痛性，並具有極高之忍容性。
2. 使用簡便，振盪後可依年齡，症狀抽取必要之份量。
3. 本劑為微粒化氯黴素製成之安定水性懸濁劑，普通肌肉注射針即能容易使用。

### 【適 應 症】

細菌性感染症：傷寒，副傷寒A及B，細菌性痢疾，細菌性肺炎，肺膿瘍，膿胸上氣道感染症，支氣管炎，扁桃腺炎，敗血症，髓膜炎，骨髓炎，胆管炎，膽囊炎，腹膜炎，潰瘍性大腸炎，沙門氏腸炎，乳幼兒腹瀉症，副鼻腔炎，耳下腺炎，耳鼻喉科感染症，結膜炎，尿路感染症，淋菌感染症，淋病，軟下疳，乳腺炎，子宮及附屬器之一般感染症，手術前後感染症之預防以及其他氯黴素感受性菌所引起之各科化膿性炎症。

螺旋體屬性感染症：梅毒。

立克次氏小體感染症：斑疹傷寒，發疹熱，恙蟲病，落磯山斑疹熱。

病毒性感染症：原發性非定型肺炎，鼠蹊淋巴肉芽病，帶狀疱疹，麻疹。

### 【用法・用量】

使用時將瓶振搖，打開保護蓋，用酒精將橡皮消毒，以相等所要量之空氣注入瓶內，再吸取藥液於注射筒內。

通常成人每次4ml(1Gm力價)，一日1~2次注射於肌內或臀肌深處，依症狀酌量增減。

乳幼兒用量依體質症狀年齡以一日每公斤體重25-50mg(力價)計算。

新生兒及早產兒用量為一日每公斤體重20mg(力價)以下。

本劑限由醫師使用。

### 【注 意】

1. 本劑吸入注射筒後應迅速使用。
2. 本劑限用於肌內注射。
3. 本劑中含有(Chloramphenicol)服用時請注意下列事項。
  - ①本劑對新生兒可能導致腹部膨脹，發紺，血管萎縮，核黃疸等副作用，應避免使用。
  - ②本劑可能導致粒性白血球缺乏病，再生障礙性貧血，服用大劑量會導致紅血球之發育不全，應經醫師處方使用必要時並應作白血球紅血球及其分類計算，遇有計數變化時，應停止使用。

### 【貯 法】

1. 室溫保存，如放置低溫時應避免凍結。

2. 避光貯藏。

### 【包 裝】

8ml×1 Vial	8ml×5 Vials	8ml×10Vials	10ml×1 Vial
10ml×5 Vials	10ml×10Vials	12ml×1 Vial	12ml×5Vials
12ml×10Vials	20ml×1 Vial	20ml×10Vials	

內衛藥製字第011564號



信東生技股份有限公司

桃園市桃園區介壽路22號