

“新喜”
制酸片

ANTACID C TABLETS “N.C.P.”

本藥須經醫師指示使用

【成分】每錠中含有：

有效成分及含量：Calcium Carbonate..... 200mg
Scopolia Extract 6mg
Magnesium Oxide 70mg
Sodium Bicarbonate 200mg

賦形劑：Lactose、Starch

【用途(適應症)】

緩解胃部不適或灼熱感或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非藥師、藥劑生或醫生指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

【用法用量】

成人及 12 歲以上	一次一錠，一天 3~4 次，或需要時服用，制酸劑之錠劑嚼碎後吞服。
12 歲以上	適用成人劑量。
6 歲以上未滿 12 歲	適用成人劑量之 1/2。
3 歲以上未滿 6 歲	適用成人劑量之 1/4。
3 歲以下之嬰幼兒	請洽醫師診治，不宜自行使用。

鎂含量：每錠含 3.5mEq. 鎂

鈉含量：每錠含 2.4mEq. 鈉

每錠酸中和能力為 5.9mEq.

【警語】

1. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，請遵循下列情況服用：
 - (1) 對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過 5g。
 - (2) 未滿 3 個月之嬰兒不得服用。
 - (3) 本藥每日最大建議劑量之含鈉超過 5mEq(0.115g)，須限鹽飲食之患者不要服用。
 - (4) 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
 - (5) 制酸劑不得併用其他藥品。
2. 如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
3. 消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
4. 本藥含鎂之制酸成份可能會引起腹瀉。
5. 本藥含鈣之制酸成分，可能會引起便秘或腹瀉；長期服用可能有高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
6. 本藥含碳酸鹽(或碳酸氫鹽)之制酸成分，可能引起腹脹、打嗝。
7. 本藥含碳酸氫鈉會引起腹脹、打嗝；如長期與鈣質牛奶併用，會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象；腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒；會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫之患者禁止使用本劑。

【保存】

本藥品應包裝於緊密容器，貯存於陰涼(25°C 以下)乾燥避光，且兒童不易取得處所。

【包裝】

1000 粒以下塑膠瓶裝。



新喜國際企業股份有限公司
台南市鹽水區孫厝里孫厝寮 4-6 號