

“信東” 腹膜灌洗液 - A

Peritoneal Dialysis Solution-A

"Sintong"

長期以來，急性腎功能衰竭的發作，被認為是危險可怕的，腎功能衰竭之患者，其腎臟解剖時可發現顯著的病變。如果能有迅速而適當的治療，這種病變，可因腎臟組織之再生而恢復正常的功能。

近來在體液及電解質生理學上的進展而有人工腎臟之發明。但因操作技術的複雜，使此法只限於有精良訓練的醫師、護士、技術員的醫療中心才能應用。於是許多學者繼續研究，終於發現腹膜可做透析膜，而腹腔可代替患者之腎小球膜及小管膜，應用為血液透析法乃成為最簡單，最方便的一種操作。因此腹腔透析法，在臨床上廣泛被應用於急性腎功能衰竭，巴比妥酸安眠藥中毒，血鉀過高，肝性昏迷等症狀之治療。

〔成份〕

主成分：每 ml 澄清 Pyrogen-free 之滅菌溶液含有：

Sodium Chloride	5.65 mg
Calcium Chloride Dihydrate	0.29 mg
Magnesium Chloride Hexahydrate	0.153 mg
Sodium Lactate Anhydrous	4.88 mg
Dextrose	15.00 mg
Sodium Bisulfite	0.06 mg

賦形劑：Water for Injection。

〔適應症〕

透析法適用於急性功能衰竭以保守療法失敗的患者。

〔用法及用量〕

腹膜灌洗，透析用，成人每透析一次需用二公升之透析液，孩童一公升即可。在 12~36 小時內作 20~25 次之透析，通常透析 24 小時即有良好之效果，但不宜超過 36 小時。事先應加注意，以免引起腹膜炎之危險。如需要時，可在 2~3 天後再行腹膜透析治療。

本藥限由醫師使用。

〔注意事項〕

1. 患有腹膜炎之病人，忌用本劑。
2. 最近有腹部手術者，亦不宜使用本劑。

〔使用之注意事項〕

(一) 取用時：

1. 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動若發現有上述情形時，請勿使用。
2. 若藥液有不澄清、變色、異物或其他異常現象時，請勿使用。

(二) 輸液套選用及插入法：

1. 請依輸液套使用方法正確使用。
2. 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免針割 (Coring) 產生碎片。
3. 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

〔包裝〕

玻璃瓶裝：100ml，250ml，500ml，1000ml

內衛藥製字第 012345 號



信東生技股份有限公司
桃園市桃園區介壽路22號