【仿單】

“福元”消膿膏 Syaunonko “F.Y.”

許可證字號：內衛藥製字第 012899 號。

【成分】每 100 公克含有：

有效成分及含量：Zinc Oxide 10.0 公克、Sulfadiazine 10.0 公克。

其他成分(賦形劑)：Mineral Oil、Lanolin Anhydrous、Beeswax、White Petrolatum。

【用途(適應症)】

急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染，緩解皮膚刺激及尿布疹。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

※曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，請洽醫師診治：

(一)3 歲以下。

(二)有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

※兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

四、其他使用上注意事項：

(一)為防止兒童誤食請妥善保管。

(二)兒童需於監護者的指導與監督下使用。

(三)避免陽光直射。

(四)勿超過建議使用量或使用次數。

(五)使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。

(六)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

(七)本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。

(八)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

(九)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

(十)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

(十一)患部有下列狀況者，建議不要使用。

- (1)有傷口或紅腫。
- (2)傷口流膿或潰爛。

(十二)請勿使用超過 7 天以上。

【用法用量】

用量	用法
一日數次	塗抹於患部，或以紗布、脫脂棉等沾取塗抹。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑士：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅、發癢、刺激感、脫皮。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一)若有上述外之其他不適情況產生。
- (二)使用 7 天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】1000 公克以下鋁軟管裝、塑膠瓶裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【保存方式】請貯存於 25°C 以下，且於期限內使用。

LT-ON005

福元化學製藥股份有限公司
新北市瑞芳區大寮路 95-1 號