

獨特之抗菌劑

# "人生" 穩得樂 片

## WINTOLON TABLETS "JEN SHENG"

本劑為新型Naphthyridine系抗菌劑，主成分又稱Nalidixic Acid，化學名為1-Ethyl-7-methyl-1, 8-naphthyridin-4-one-3-carboxylic acid，臨床上證明對尿路感染症包括淋性子宮炎確有卓效，對腸部沙門氏菌及志賀氏菌之感染，尤屬有效。一般革蘭氏陰性菌，陽性菌均屬其治療範圍，低濃度時即對大腸菌有殺滅作用，其作用與Furaltadone, Nitrofurantoin, Chloramphenicol, Oxytetracycline及Sulfadiazine可以媲美。

【主成分】：每片中含有：

Nalidixic Acid.....500mg

【賦形劑】：Lactose、Starch、Magnesium Stearate、Polyvidone K-30、Sodium Starch Glycolate。

【適應症】：

革蘭氏陰性菌感染症、急、慢性尿路感染症、膀胱炎、腎盂腎炎、攝護腺炎、產後腎盂炎、輸尿管及子宮炎而引起之腸部感染症、腹瀉、痢疾、副傷寒、淋病。

【用法用量】：

(1) 對尿路感染症：

成人：通常一日3次，每次1~2片，維持量每次1片。

兒童：通常一日每公斤體重50mg一日3次，但早產兒及一個月以下之嬰幼兒禁用。

下表僅供醫師參考：

年齡	每次量	日服總量
滿1個月至1歲	125mg. 日服2~3次	250mg. ~375mg.
滿1歲至2歲	250mg. 日服2~3次	500mg. ~750mg.
滿2歲至6歲	250mg. 日服3次	750mg.
滿6歲至14歲	500mg. 日服2~3次	1g. ~1.5g.
滿14歲以上	依成人用量	
兒童之維持量，依上表各年齡量之半量。		

(2) 對腸部感染症：

成人：通常一次1~2片，一日3次。

兒童：如上表，但治療期間較短。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：

(1) 一個月以下嬰兒及懷孕三個月以內之孕婦不得使用本劑。

(2) 繼續使用本劑一至二星期以上應作定期血液及肝臟機能試驗。

(3) 糖尿病患者於服用本劑期間檢驗尿糖時應採用試紙法如

CLINSTIX TESTTAP等而不宜使用BENEDICT FEHLING或CLINIC TEST等法以避免錯誤，蓋因本品在體內即部份變成糖基結合物(GLUCURONIC CONJUGATE)排出體外，此時如使用還原法檢驗尿糖則易發生錯誤。

【儲存】：儲存於25°C以下。

【包裝】：6~1000片塑膠瓶裝及銀箔盒裝。

內衛藥製字第13302號



PIC/S GMP優良藥廠  
人生製藥股份有限公司  
台灣台中市工業區五路3號  
JEN SHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.  
TAICHUNG TAIWAN