內衛藥製字第 014296 號

# 特體松片
# DEXAMETHASONE
# TABLETS

新安全的皮質副酮製劑

## 【概　　述】

本劑每片含有Dexamethasone 0.5mg為迄今人工所合成的腎上腺皮質副酮中新型，作用強，而副作用少的一種。其抗炎症，抗過敏及抗風濕的效力較之Hydrocortisone強三倍，較Prednisolone強八倍，較Triamcinolone尚強五倍。可以長期使用無頭痛，噁心等副作用，不易誘發鈉及水份的滯留糖尿病、高血壓、及精神不正等後遺症。

## 【賦　形　劑】

Lactose、Starch、Tartrazine、Magnesium Stearate

## 【用法及用量】

通常以Prednisolone劑量的1/8量計算服用。將一日總計量分作兩份，早晚服用，至稱便利，對下列數種適應症之用法用量概列之以供參考。

1. 非致命性慢性疾病（如風濕樣關節炎，慢性氣喘病等），通常一日量為三至六片隔數日遞減之，直至最小的維持劑量（通常約為一至一片半）。
2. 非致命性急性疾病(如季節性氣喘重症，急性自限眼部及皮膚疾患等)每日四至六片。
3. 豫後不佳的急性慢性疾病（如急性風濕熱，擴散型紅斑性狼瘡腎炎症徵狀羣等）開始劑量稍大，每日可服四至九片以圖迅速挽救危機。

## 【劑量的減少】

本藥須由醫師處方使用。

病情轉佳後，即應函物遞減服用的劑量，通常每隔三或五天減少半片至一片，直至達到最低的有效維持量。

## 【適　應　症】

風濕性疾患、過敏性疾患。

## 【注　　意】

**本劑除對糖尿患者使用較自由外，其他使用上應注意各點，大致與使用Prednisolone時相同。**

**本劑中含有(Prednisolone)服用時請注意下列事項：**

**一、 急慢性感染症，使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾病。**

**二、 對消化管障害如胃腸潰瘍務請特別注意。**

**三、 因主要副作用引起浮腫，血壓上升，尤以腎臟疾患及高血壓患者應注意。**

**四、 糖尿病患者使用時有增加Iusulin藥量的必要者請注意。**

**五、 對於有精神病因素者多加注意。**

**六、 服用本劑期間請充分補充蛋白質。**

【包　　裝】

6 ~1000粒瓶裝。