Codecol Codeco

可待咳糖漿 CODECOL Syrup

本品係根據優秀處方配製而成之鎮咳、祛痰劑，所含之桔梗為神農本草經所收錄，可使粘稠分泌物濕軟，而容易將濃痰喀出，達到祛痰之效果，同時具有溫和之鎮咳作用；更配以鎮咳效果良好之Codeine Phosphate，而使鎮咳效果更加理想。因此，本品實兼具中西藥物之優點，可謂鎮咳、祛痰之優秀治療劑。

成　　分：每1ml含有：

Platycodon Fluid Extract.....0.06ml

Codeine Phosphate.....1.5mg

適 應 症：

鎮咳、祛痰(支氣管炎、咽喉炎所引起之咳嗽及喀痰)。

用法用量：

通常成人每次4ml，一日3次。兒童酌減。

本藥須由醫師處方使用

注　　意：

1.長期使用易致成癮。

2.本品含桔梗生藥成分，故可能會產生微細沉澱，使用前搖勻，即可安心服用。

禁 忌 症：

(一)已知CYP2D6超級快速藥物代謝者(ultra-rapid metabolizers) 。

(二)哺乳婦女。

警　　語：

(一)Codeine會經由肝臟酵素CYP2D6代謝為活性成分morphine。如果病人、屬於快速代謝者(extensive metabolizer) 或超級快速代謝者(ultra-rapid metabolizer)，即使是在正常使用劑量，亦可能會發生鴉片中毒症狀，且可以於病人血液中檢測到比預期高之morphine成分。

在亞洲族群，超級快速代謝者(ultra-rapid metabolizer) 之盛行率為1.2%-2%。一般鴉片中毒症狀包括意識混亂、異常嗜睡、癱軟、呼吸緩慢或微弱、瞳孔變小、噁心、嘔吐、便祕、食慾不振等，嚴重會導致呼吸抑制，甚至導致死亡。

(二)謹慎使用本品於未滿12歲兒童，因可能會增加發生嚴重不良反應之風險。經醫師專業評估臨床效益大於風險時，方可考慮使用，且應依年齡減量使用，並特別提醒病人及其照護者，如發生鴉片中毒之相關症狀，應立即停藥並就醫治療。

(三)不建議使用本品於12 至18 歲具呼吸功能不全之兒童，例如具有神經肌肉疾病、嚴重心臟或呼吸系統疾病、上呼咬道或肺部感染及多重創傷或大範圍外科手術等，因可能會增加發生嚴重不良反應之風險，倘經評估仍需使用，應特別提醒病人及其照護者，如發生鴉片中毒之相關症狀，應立即停藥並就醫治療。

(四)禁止產婦於哺乳期間使用本品，因可能對於受哺乳嬰兒造成鴉片中毒之風險。雖然在正常治療劑量下，母乳中僅存在極低濃度之codeine 與其活性代謝物，不太會對嬰兒產生不良反應，但屬CYP2D6超級快速藥物代謝之哺乳婦女，母乳中可能會存在高濃度之活性代謝物，可能對於受哺乳嬰兒產生鴉片中毒症狀，例如異常嗜睡、癱軟、餵養困難、呼吸困難，嚴重可能會致死。因此，產婦如需使用本品治療，應避免以用藥期間之母乳哺餵嬰兒。

(五)肝、腎功能不全者，應小心謹慎減量使用。

(六)長期使用易致成癮。

(七)腎上腺功能不全風險:曾有使用opioid類藥品發生腎上腺功能不全之通報案例，且多數案例為使用該類藥品超過一個月者。腎上腺功能不全可能以非特異性症狀表現，例如噁心、嘔吐、厭食、疲倦、虛弱、眩暈及低血壓等。如懷疑病人發生腎上腺功能不全，應儘速進行相關檢查，倘經確診為腎上腺功能不全，應停止使用原opioid成分藥品，並持續使用皮質類固醇類藥品進行治療，直到腎上腺功能復原。另可嘗試使用其他不同成分之opioid藥品，因曾有通報案件，於更換其他不同成分之opioid藥品後，未再出現腎上腺功能不全之情形。惟依目前現有資料，尚無法認定有特定opioid成分與腎上腺功能不全較有相關性。

(八)併用benzodiazepine類藥品或其他中樞神經系統抑制劑之風險:含codeine成分藥品併用benzodiazepine類藥品或其他中樞神經系統抑制劑(如:肌肉鬆弛劑、全身麻醉劑、酒精)，可能會引起重度鎮靜(profound sedation)、呼吸抑制、昏迷及死亡等風險，故除非無其他適當治療方式，方可考慮使用。倘同時處方opioid類止痛藥品及benzodiazepine成分藥品或其他中樞神經系統抑制劑，應使用最低有效劑量及最短治療期程。當對於正在使用opioid類止痛藥品之病人，新增處方benzodiazepine成分藥品或其他中樞神經系統抑制劑時，抑或針對正在使用benzodiazepine成分藥品或其他中樞神經系統抑制劑之病人，新增處方opioid類止痛藥品時，應使用較低之初始劑量，且依據病人臨床表現調整劑量，並嚴密監測病人相關不良反應之發生。此外，應特別提醒病人及護理人員注意呼吸抑制和鎮靜之風險，病人於用藥期間亦不宜駕駛或操作危險器械。另針對具有濫用藥物可能之病人，應警告病人切勿飲酒或使用不法濫用藥物，否則可能會有過量和致死之風險。

副 作 用：

(一)雄性激素缺乏:曾有使用opioid類藥品發生雄性激素缺乏之通報案例，且多數案例為使用該藥品超過一個月者。

(二)血清素症候群:曾有使用opioid類藥品併用血清素作用劑藥品(serotonergic drugs)發生危及生命之血清素症候群(serotonin syndrome)通報案例。

賦 形 劑：

Citric Acid Anhydrous、Sodium Bicarbonate、Sodium Dehydroacetate、Sucrose、Glycerin、Caramel、Menthol、Alcohol 95%、Strawberry Oil、Red Currant、Purified Water

包　　裝：24-4000ml瓶裝。

內衛藥製字第015951號　Code No. LC-03 3214040

藥商：
PIC/S GMP 藥廠
生達化學製藥股份有限公司
台南市新營區土庫里土庫6之20號

製造廠：
PIC/S GMP 藥廠
生達化學製藥股份有限公司 二廠
台南市新營區開元路154號

20170901