外盒、仿單、標籤黏貼表

產品名稱	"利達"利可胃錠	申請廠商	利達製藥股份有限公司
衛生署給證號碼	內衛藥製字 第 016304 號		

〝利達〞

LCT

利可胃錠

Licowei Tablets〝LITA〞

【作用】

1.本藥含有抗潰瘍性因子維他命 U，能使胃潰瘍，十二指腸潰瘍患者之潰瘍粘膜於短期內恢復原狀。

2.合成矽酸鋁(Synthetic Aluminum Silicate)能沉著於胃粘膜上，緩和胃酸的刺激，可保護因潰瘍等症所受傷之黏膜，此外還有制酸，及吸收作用，治療胃酸過多症，確有卓著效果。

3.乾燥氫氧化鋁膠(Dried Aluminum Hydroxide Gel)為胃的制酸劑，尤其對胃潰瘍、十二指腸潰瘍有效，其特點為可中和胃酸，但不影響胃液的消化功能。

4.碳酸鎂(Magnesium Carbonate)及次硝酸鉍(Bismuth Subnitrate):前者有制酸作用，後者有收斂作用、及附著在潰瘍面上以保護粘膜使潰瘍早日痊癒。

5.東莨菪浸膏(Scopolia Extract):具有鎮痛、鎮痙作用，作用於副交感神經，抑制胃酸分泌及胃之緊張，並弛緩胃壁，因其鎮痛作用好，故對於各種病狀的胃痛以及胃痙攣有良好的效果。

6.葉綠酸銅鈉鹽(Sodium Copper Chlorophyllin):可以幫助胃黏膜新生並增加免疫力，發揮顯著治療效果。

【成分】每錠含：

有效成分及含量：	**Methylmethionine Sulfonium Chloride**	**10mg**
	Aluminum Silicate	**150mg**
	Aluminum Hydroxide Dried Gel	**100mg**
	Magnesium Carbonate	**100mg**
	Bismuth Subnitrate	**50mg**
	Scopolia Extract	**7mg**
	Chlorophyll Sodium Copper	**2mg**

其他成分(賦形劑)：Corn Starch、Primojel、Stearic Acid、Sodium Lauryl Sulfate、Povidone K-30、Pregelatinized Starch

【用途(適應症)】胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃酸過多症、胃痛、胃痙攣。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用:

曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治:

(一) 5 歲以下。

(二)消化道潰瘍的人。

(三)腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用。)

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生:

(一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二)與其他藥品併用時。

四、其他使用上注意事項:

(一)為防止兒童誤食請妥善保管。

(二)避免陽光直射。

(三)勿超過建議使用量。

(四)一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。

(五)制酸劑之錠劑應嚼碎後吞服。

【用法用量】

年紀	使用量
成人	一次服用二錠，一日三次，每次於食用或食間服用。
8 歲至 15 歲	適用成人劑量之 1/2 。
5 歲至 7 歲	適用成人劑量之 1/4 。
未滿 5 歲	請洽醫師診治。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	*副作用*
胃腸道	*便祕、噁心、嘔吐、腹瀉、腹脹、打嗝*

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治:

(一)若有任何不適情況產生。

(二)連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】12 ~1000 粒塑膠瓶裝。

【儲存】25℃以下避光儲存。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【諮詢電話】04-26872345

4 711457 270422

4 711457 270446

4 711457 270439