

“利達”

## 利可胃錠

Licwei Tablets “LITA”

LCT

【作用】

- 1.本藥含有抗潰瘍因子維他命U，能使胃潰瘍，十二指腸潰瘍患者之潰瘍粘膜於短期內恢復原狀。
- 2.合成矽酸鋁(Synthetic Aluminum Silicate)能沉著於胃粘膜上，緩和胃酸的刺激，可保護因潰瘍等症所受傷之粘膜，此外還有制酸，及吸收作用，治療胃酸過多症，確有卓著效果。
- 3.乾燥氫氧化鋁膠(Dried Aluminum Hydroxide Gel)為胃的制酸劑，尤其對胃潰瘍、十二指腸潰瘍有效，其特點為可中和胃酸，但不影響胃液的消化功能。
- 4.碳酸鎂(Magnesium Carbonate)及次硝酸鉍(Bismuth Subnitrate):前者有制酸作用，後者有收斂作用、及附著在潰瘍面上以保護粘膜使潰瘍早日痊癒。

1

5.東莨菪浸膏(Scopolia Extract):具有鎮痛、鎮痙作用，作用於副交感神經，抑制胃酸分泌及胃之緊張，並弛緩胃壁，因其鎮痛作用好，故對於各種病狀的胃痛以及胃痙攣有良好的效果。

6.葉綠酸銅鈉鹽(Sodium Copper Chlorophyllin):可以幫助胃粘膜新生並增加免疫力，發揮顯著治療效果。

【成分】每錠含：

有效成分及含量：

- Methylmethionine Sulfonium Chloride.....10mg
- Aluminum Silicate .....150mg
- Aluminum Hydroxide Dried Gel.....100mg
- Magnesium Carbonate.....100mg
- Bismuth Subnitrate.....50mg
- Scopolia Extract .....7mg
- Chlorophyll Sodium Copper.....2mg

其他成分(賦形劑)：Corn Starch、Primojel、Stearic Acid、Sodium Lauryl Sulfate、Povidone K-30、Pregelatinized Starch

2

【用途(適應症)】

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃酸過多症、胃痛、胃痙攣。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：  
曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：  
(一)5歲以下。  
(二)消化道潰瘍的人。  
(三)腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用。)
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑生：  
(一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。  
(二)與其他藥品併用時。

3

四、其他使用上注意事項：

- (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二)避免陽光直射。
- (三)勿超過建議使用量。
- (四)一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
- (五)制酸劑之錠劑應嚼碎後吞服。

【用法用量】

年紀	使用量
成人	一次服用二錠，一日三次，每次於食用或食間服用。
8歲至15歲	適用成人劑量之1/2。
5歲至7歲	適用成人劑量之1/4。
未滿5歲	請洽醫師診治。

4

【警語】

一、服用本藥後若有發生以下副作用請立即停止使用並持此說明書諮詢醫師藥劑生：

身體部位	副作用
胃腸道	便秘、噁心、嘔吐、腹瀉、腹脹、打嗝

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一)若有任何不適情況產生。
- (二)連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】12~1000粒塑膠瓶裝。

【儲存】25°C以下避光儲存。

【類別】醫師藥劑生指示藥品。

【諮詢電話】04-26872345

內衛藥製字第016304號

5

LCT 1000'S

### 利可胃錠

【有效成分及含量】

- Methylmethionine Sulfonium Chloride.....10mg
- Aluminum Silicate .....150mg
- Aluminum Hydroxide Dried Gel.....100mg
- Magnesium Carbonate.....100mg
- Bismuth Subnitrate.....50mg
- Scopolia Extract .....7mg
- Chlorophyll Sodium Copper.....2mg

【其他成分(賦形劑)】Corn Starch、Primojel、Stearic Acid、Sodium Lauryl Sulfate、Povidone K-30、Pregelatinized Starch

【用途(適應症)】胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃酸過多症、胃痛、胃痙攣。

【不得混用族群】曾因本藥成分引起過敏的人。

【用法用量】成人，一次服用二錠，一日三次，每次於食用或食間服用；8歲至15歲，適用成人劑量之1/2；5歲至7歲，適用成人劑量之1/4；未滿5歲，請洽醫師診治。

【類別】醫師藥劑生指示藥品。

【諮詢專線】04-26872345

【批號】

【製造日期】

【有效期間】



4 7 1 1 4 5 7 1 2 7 0 4 2 2

內有使用說明書，請由此打開。



本藥應置於小兒伸手不及處，使用前請詳閱說明書。25°C以下避光儲存。請在有效期間內使用。本藥適用藥費負擔制度。

【許可證字號】內衛藥製字第016304號

利達製藥股份有限公司  
LITA PHARMACY CO., LTD.  
台中市大甲區中山路一段906號  
TEL：04-2687-2345  
http://www.litacorp.com



利達製藥股份有限公司  
LITA PHARMACY CO., LTD.  
台中市大甲區中山路一段906號  
消費者服務專線04-26872345