出的尿液最佳，因此時的尿液中的 HCG 濃度最高，對於剛懷孕的測試會更準確。

5、 我的測試結果是陽性，我該怎麼做？

請詢問你的醫生意見。醫生能透過做出臨床試驗及化驗報告的評估，確定你已懷孕的測試結果。在某些情況下，測試結果有可能出現錯誤的陽性反應。另外，醫生亦會為你提供有關懷孕的進一步資料及意見。

請同時參閱「限制」部分。

6、 我的測試結果是陰性，我該怎麼做？

如果你有理由認為自己懷孕了（如經期停止），你可以在 48 小時後，再測試一次。如果測試結果仍然是「陰性」反應，請你向你的醫生查詢。

限制

1、未經醫生做出臨床試驗及化驗報告的評估前，不能單靠此測試結果，診斷為懷孕。

2、如尿液樣本過分稀釋，HCG 水平會過低，以致未能反映出正確的測試結果。若您對是否懷孕仍感疑惑，請於 48 小時後，收集另一個樣本，重複測試。

3、早期懷孕所產生的 HCG 水平較低，因而會出現陰性反應。此情況下，請於最少 48 小時後，收集另一個樣本，重複測試。

4、除懷孕外，還有其他因素會引起 HCG 水平的上升。若將此驗孕試劑用於懷疑有子宮腫瘤、更年期或是異位懷孕、葡萄胎、不可避免的流產及過期流產等不正常妊娠現象之婦女，則測試結果仍可能呈陽性反應。因此，除非排除上述因素，在尿液檢體中呈現 HCG，並無法作為懷孕診斷。

5、單憑透過測試 HCG 的水平並無法分辨正常的懷孕或異位的懷孕。同時，自發性流產亦會混淆測試結果的解釋。

6、以 HCG 為基礎的不孕症治療，可能會帶來錯誤的測試結果。詳細請向你的醫生查詢。

注意

1、供家庭驗孕用。
2、僅供體外診斷使用。
3、供一次性使用，使用後請棄掉。
4、請勿使用過期的驗孕筆。
5、若鋁箔袋已損壞，請勿使用。
6、請放置於孩童不易取得之處。