

歐蘭靜膜衣錠 5毫克

Olanzapine film coated tablets 5mg

定性和定量組成

歐蘭靜膜衣錠5毫克錠劑含5毫克 Olanzapine。

製劑

歐蘭靜膜衣錠5毫克錠劑為白色膜衣錠，印有“cBc”字樣和數字辨別碼“126”。

臨床特性

適應症

思覺失調症及其他明顯有正性及/或負性之精神病，雙極性疾患之躁期發作，預防雙極性疾患之復發。

說明：

Olanzapine適用於思覺失調症的治療。

如病患經初期藥物治療已獲療效時，在其繼續治療期間，olanzapine能有效維持病情的改善。

Olanzapine適用於雙極性疾患，躁期的治療。

對於使用olanzapine治療躁症有效的病患，olanzapine可用於預防雙極性疾患之復發(見藥動性質欄)。

用法用量

成人：

思覺失調症：Olanzapine的建議起始劑量為每天一次，每次 10 毫克。

雙極性疾患之躁期發作：單一治療之起始劑量為每天一次，每次 15 毫克；合併治療之起始劑量為每天 10 毫克。(見藥效性質欄)

預防雙極性疾患之復發：建議起始劑量為每天 10 毫克。已使用olanzapine治療躁症的病患，持續以原劑量來預防復發。若是出現新躁症、混合症狀或憂鬱症狀，olanzapine應持續使用(依需要給予最佳劑量)。臨床上有情緒症狀可佐以輔助治療。

治療思覺失調症、躁症及預防雙極性疾患之復發時，每日劑量可依病患的臨床狀況調整，劑量範圍為每天 5-20 毫克。惟有經過適當的臨床評估後，才可建議將劑量調整至常用治療劑量以上，且給藥間隔不得小於 24 小時。進食不影響olanzapine的吸收。應以逐漸遞減劑量方式停用olanzapine。

目前沒有olanzapine用於 18 歲以下病患的臨床研究。

特殊族群

老年人：一般情況下不會使用較低的起始劑量(5 毫克/天)，但如視臨床因素需要時，65 歲以上的老年病患應考慮使用此劑量(見警語和注意事項欄)。

腎和/或肝功能不全的病患：此類病患應考慮給予較低的起始劑量(5 毫克)。對於肝功能中度不全的病患(肝硬化、Child-Pugh A 或 B 類肝炎)，其起始劑量應為 5 毫克，欲增加劑量時須謹慎。

吸煙病患：相較於吸煙病患，不需要調整不吸煙病患的起始劑量與劑量範圍。Olanzapine的代謝可能被吸煙誘導。

建議做臨床檢測，並且考慮視需要增加Olanzapine的劑量(見與其他藥物的交互作用及其他形式的交互作用欄)。

當多於一項會降低代謝速率的因子出現於同一病患時(女性、老年、不吸煙)，應考慮是否降低起始劑量。若需調高劑量時，此類病患的劑量調幅應較保守。

(見與其他藥物的交互作用及其他形式的交互作用欄和藥動性質欄)。

孩童族群：

因為缺乏安全性和療效性的資料，不建議孩童和十八歲以下的青少年服用olanzapine。在一些短期的試驗中，青少年體重增加，脂肪及泌乳素改變的幅度較成年病患高(見警語和注意事項、副作用、藥效性質及藥動性質欄)。

禁忌(依文獻記載)

Olanzapine禁用於已知對此藥品的任何成分(有效成分或賦形劑)過敏者。Olanzapine禁用於已知患有狹角性青光眼的病患。

警語和注意事項(依文獻記載)

於抗精神病治療期間，病患臨床情況的改善須數天至數週。於此期間須嚴密觀察病患的情形。

失智症相關之精神病及行為混亂

依據隨機分派，有對照組的臨床試驗(Randomized controlled trial, RCT)及回溯性世代研究(Retrospective cohort study)發現，抗精神病藥品，包括傳統(Conventional)與非典型(Atypical)之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患(dementia-related psychosis)的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性較高。

Olanzapine不建議用於失智症相關之精神病及/或行為混亂患者之治療，因為死亡率與腦血管病變危險性增高。

在一例患有失智相關精神病及/或行為混亂的老年(平均 78 歲)所做之安慰劑對照臨床研究中(為期 6-12 週)，服用olanzapine之患者死亡率為服用安慰劑患者的一倍(3.5% 相較於 1.5%)。較高死亡率與olanzapine劑量(平均每日 4.4 毫克)或治療期長短無關。可能造成這類患者的死亡率增高的危險因子包括：年齡 65 歲、語言障礙、鎮靜、營養不良和脫水、肺部狀況(如肺炎、伴隨或沒有吸入性原因)或與benzodiazepines併用；然而，相較於服用安慰劑的患者，服用olanzapine患者之死亡發生率較高則與這些危險因子無關。

在同一臨床研究中，曾有腦血管方面的不良反應(CVAE如中風、暫時性腦缺血)，包括一些致死案例的報告。服用olanzapine患者之CVAE發生率為服用安慰劑患者的三倍(1.3% 相較於 0.4%)。所有服用olanzapine與服用安慰劑曾發生CVAE的患者都帶有既有的危險因子。年齡大於 75 歲以及血管性/混合性失智症被認為是olanzapine治療時發生CVAE的危險因子。Olanzapine的療效並未在這些臨床研究中確立。

帕金森氏症

不建議使用olanzapine來治療帕金森氏症病患因服用dopamine作用劑所引起的精神疾病。於臨床研究中，帕金森氏症惡化與產生幻覺報告很常見且發生次數也比安慰劑組多(見副作用)，相較於安慰劑，olanzapine對此類精神病治療並沒有比較有效。這些臨床試驗中，病患最初要求的是能在最低有效劑量的抗帕金森氏症藥物(dopamine作用劑)下維持穩定，自整個研究過程中始終保持使用相同抗帕金森氏症藥物與劑量。係基於試驗醫師的判斷，olanzapine開始用 2.5 毫克/天爾後再調整到最高 15 毫克/天。

抗精神病藥物惡性症候群(NMS)

NMS為一種可能因服用抗精神病藥物導致有生命危險的症候群。有極少數NMS報告與olanzapine有關。NMS在臨床上的表現包括高燒、肌肉僵直、精神狀態改變、及自主神經功能不穩定(不整脈或血壓不正常、心跳過快、盜汗及心律不整)。其他徵兆可能包括肌酸酐磷酸激酶活性升高、肌球蛋白尿(橫紋肌溶解症)，及急性腎衰竭。臨床上一旦發現有NMS徵兆，或不明原因的高燒但無其他NMS的徵兆時，應立即停用所有抗精神病藥，包括olanzapine。

高血糖及糖尿病

高血糖及/或糖尿病的產生或惡化並偶爾伴隨酮酸血症或昏迷的報告不常見，包含少數死亡案例(見副作用)。有些例子中，病患先前的體重增加，也可能是引起這些症候的原因。可依據抗精神病治療指引執行適當的臨床監測，例如使用前量測血糖的基本值，使用 12 週後及每年量測血糖值。接受任何抗精神病藥品之病人，包括Olanzapine，應密切留意高血糖症狀(如：劇渴、多尿、多食或無力)。有糖尿病或糖尿病危險因子之病人，應定期監測血糖是否惡化。應該要定期監測體重，例如使用前量測體重的基本值，使用 4、8、12 週後及每 3 個月量測體重。

脂肪改變

在以安慰劑作為對照組的臨床試驗中觀察到服用olanzapine之病患其脂肪有不良的改變(請見副作用)。脂肪之改變在臨牀上必須要有適當地管控，特別是血脂異常的病患以及有血脂異常危險因子的病患。服用任何抗精神病藥物的病人，包括Olanzapine，應該要依據精神病治療指引定期監測脂肪，例如使用前量測脂肪的基本值，使用 12 週後及每 5 年量測脂肪。

抗膽鹼素活性

雖然olanzapine在體外試驗中顯示有抗膽鹼素活性，臨床試驗的結果顯示相關不良反應的發生率低。然而，olanzapine用於有其他併存疾病的病患之臨床使用經驗有限，因此開處方於同時患有攝護腺肥大、或麻痺性腸阻塞和其他相關病情的病患時，必須謹慎。

肝功能

常見有暫時、無症狀的肝轉胺酶—ALT、AST濃度上升的現象，尤其在治療初期。下列病患服用olanzapine時應小心謹慎並安排追蹤：ALT和/或AST上升的病患、肝損害徵兆和症狀的病患、既有肝功能有限的病患、及病患正在服用具肝毒性的藥品。一旦診斷出肝炎(包括肝細胞型，膽汁鬱積型或是混合型肝損害)，應停止olanzapine的治療。

嗜中性白血球減少症

下列病患服用olanzapine時應小心謹慎：因任何理由造成白血球和/或嗜中性白血球數目低下的病患、正在接受會造成嗜中性白血球減少症的治療的病患、曾因藥物引起骨髓抑制/毒性的病患、及其他併存疾病、放射治療、或化療而導致骨髓抑制的病患、及嗜伊紅血球過多症或骨髓增殖症的病患。Olanzapine與valproate併用時，曾有嗜中性白血球減少症的報告(見副作用欄)。

停藥

當olanzapine突然中斷使用，罕見有急性症狀如出汗、失眠、顫抖、焦慮、噁心、或嘔吐的報告出現(≥ 1/10,000 到 < 1/1,000)。應以逐漸遞減劑量方式停用olanzapine。

QT期間

在臨床試驗中，olanzapine治療之患者出現具意義的QTc期間延長(病患治療前QTcF<500毫秒，治療後一直表現Fridericia QT校正[QTcF]>500毫秒的情形)並不常見(1/1,000 到 1/100)，且相較於安慰劑組，發生心臟方面不良事件並無顯著差異。然而，當olanzapine與其他已知會造成QTc間隔延長的藥物併用時，尤其是用於老年人、先天性QT期間長、充血性心衰竭、心臟肥大、低血鉀症或低血鎂症之病患，必須謹慎。

血栓性栓塞症

目前olanzapine與發生靜脈栓塞相關性的報告不常見(≥ 1/1,000 到 < 1/100)。Olanzapine治療與靜脈栓塞發生之因果關係尚未確立。然而思覺失調病患常表現靜脈栓塞危險因子，因此所有靜脈栓塞可能危險因子、如靜止不動的患者應予確認及給予適當預防措施。

一般中樞神經活性

由於olanzapine主要作用於中樞神經系統，故與其他中樞神經作用藥物和酒精併用時應謹慎。體外試驗中，olanzapine顯示有dopamine拮抗作用，因此olanzapine可能直接或間接拮抗dopamine作用劑的作用。

癲癇

曾有癲癇發作病史或有可能降低發作閥值危險因子的病患，必須謹慎使用olanzapine。接受olanzapine治療的病患，出現癲癇的現象不常見，這些病例中多數病患都有癲癇發作的病史或危險因子。

遲發性運動困難症

在為期一年或一年以下的比較性試驗中，olanzapine組發生需要緊急治療的運動困難之發生率於統計上明顯較低。然而，在長期使用時，遲發性運動困難症的風險增加，因此如病患有遲發性運動困難症的徵兆或症狀時，則應考慮減少olanzapine劑量或停藥。停藥後，這些症狀可能短暫性惡化或甚至復發。

姿勢性低血壓

在olanzapine的臨床試驗中，老年病患並不常出現姿勢性低血壓。建議 65 歲以上的病患在服藥期間，應定期測量血壓。

心因性猝死

在Olanzapine上市後的報告中，有報告顯示使用Olanzapine的病人產生心因性猝死的事件。在一個回溯、觀察性的世代研究中，使用Olanzapine的病人產生可能的心因性猝死的風險，大約是沒有使用抗精神病藥物病人的兩倍，在這個研究中，Olanzapine和其他包含於綜合分析中的非典型抗精神病藥物造成的風險是相當的。

孩童族群

Olanzapine不適用於孩童和十八歲以下青少年。在十三到十七歲病患的研究中，有一些不良反應產生，包括體重增加、代謝參數改變及泌乳素上升。(請見副作用和藥效性質欄)。

與其他藥物的交互作用及其他形式的交互作用(依文獻記載)

僅於成年人執行藥物交互作用研究

其他藥物影響olanzapine的能力：Olanzapine經由酵素CYP1A2代謝，因此對此酵素具特別地誘導或抑制作用之物質，皆可能影響olanzapine之藥動性質。

誘導CYP1A2 活性：吸煙或服用carbamazepine皆可誘導olanzapine代謝，降低olanzapine血中濃度，但僅些微增加olanzapine清除率。雖對臨床效用影響有限，仍建議臨床監測，並於需要時增加olanzapine劑量(見用法用量欄)。

抑制 CYP1A2 活性：Fluvoxamine為CYP1A2選擇性抑制劑，顯著抑制olanzapine代謝。在併用fluvoxamine

之後，olanzapine Cmax在女性非吸煙者平均增加 54% 及在男性吸煙者平均增加 77%；其olanzapine AUC分別平均增加 52% 和 108%。使用fluvoxamine或其他CYP1A2抑制劑，如ciprofloxacin，應考慮給予較低的olanzapine起始劑量。如開始以CYP1A2抑制劑治療時，應考慮降低olanzapine劑量。

降低生體可用率：併用活性碳會降低口服olanzapine 50% 至 60% 的生體可用率，因此活性碳應於olanzapine給藥前/後 2 小時投予。Fluoxetine(CYP2D6抑制劑)、單次劑量制酸劑(鋁、鎂)或cimetidine，尚未發現對olanzapine的藥動性質產生顯著的影響。

Olanzapine影響其他藥物的能力：Olanzapine可能直接或間接拮抗dopamine作用劑的作用。

體外試驗顯示，olanzapine不會抑制CYP450系統之主要酵素(包括1A2、2D6、2C9、2C19、3A4)；臨床試驗也證實，olanzapine不會抑制三環抗鬱劑(主要經由CYP2D6代謝途徑)、warfarin(CYP2C9)、theophylline(CYP1A2) 或 diazepam(CYP3A4 與 CYP2C19) 的代謝。

Olanzapine與鋰鹽或biperiden併用，顯示無交互作用。

臨床監測valproate血中濃度顯示，當Olanzapine與valproate併用時，不需調整valproate的劑量。

一般中樞神經活性：對於酒精使用者和服用會抑制中樞神經藥物的病患，應小心謹慎。同時有帕金森氏症和失智症的病患，不建議併用olanzapine和抗帕金森氏症的藥物(請見警語和注意事項)。

QTc期間：當olanzapine與已知會造成QTc期間延長的藥物併用時，應小心謹慎(請見警語和注意事項)。

生殖、懷孕和授乳期的使用：(依文獻記載)

懷孕

使用olanzapine於孕婦的情形，在臨牀上未有足夠及適當控制組的研究報告。應建議病患在服用olanzapine期間，若發現懷孕或計劃懷孕，應告知醫生。由於此藥用於人體的經驗有限，因此應只在用藥的好處遠大於可能對胎兒產生的傷害時，才可於懷孕期間用藥。

胎兒於懷孕第三期曾接觸到精神科藥品(包括olanzapine)，於出生後會有風險產生不同嚴重度及持續時間長度的副作用，包括錐體外及/或藥品戒斷症候群。目前曾有激動、張力過強、張力過低無力、顫抖、思睡、呼吸困難，或進食異常的報告。所以，應小心監測新生兒。

授乳

在一個授乳的健康婦女研究中，olanzapine可自乳汁中排泄。於穩定狀態，嬰兒之平均暴露量(毫克/公斤)約為母親olanzapine劑量(毫克/公斤)的 1.8%。

建議病患於olanzapine服藥期間，不要授母乳給嬰兒。

生殖力

對生殖力的影響仍未未知(請見臨床前安全性資料欄)。

對駕駛和操作儀器能力的影響：(依文獻記載)

目前並沒有對駕駛和操作儀器能力上的影響作研究。因olanzapine可能引起嗜睡及眩暈，故病患服用olanzapine時，操作機械，包括駕駛車輛，應格外謹慎。

副作用：(依文獻記載)

安全性資料摘要

成人

在臨床試驗中，與服用olanzapine相關之最常見的副作用(在 ≥ 1/100 的病患中觀察到)為嗜睡、

及 $\geq 25\%$ 是很常見的(分別為64.4%、31.7%及12.3%)。

²平均空腹血脂的升高(總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇和三酸甘油脂)在原本沒有血脂異常跡象的病患身上更顯著。

³有觀察到從治療前空腹正常值(<5.17mmol/l)增加到高總膽固醇($\geq 6.2\text{mmol/l}$)。空腹總膽固醇從治療前邊緣範圍(≥ 5.17 至 $< 6.2\text{mmol/l}$)增加到高總膽固醇($\geq 6.2\text{mmol/l}$)是很常見的。

⁴有觀察到從治療前空腹正常值(<5.56mmol/l)增加到高血糖($\geq 7\text{mmol/l}$)。空腹血糖從治療前邊緣範圍(≥ 5.56 至 $< 7\text{mmol/l}$)增加到高血糖($\geq 7\text{mmol/l}$)是很常見的。

⁵有觀察到從治療前空腹正常值(<1.69mmol/l)增加到高三酸甘油脂($\geq 2.26\text{mmol/l}$)。空腹三酸甘油脂從治療前邊緣範圍(≥ 1.69 至 $< 2.26\text{mmol/l}$)增加到高三酸甘油脂($\geq 2.26\text{mmol/l}$)是很常見的。

⁶臨床試驗中，接受olanzapine治療的病患其帕金森氏症候群與肌張力不全的發生率相較於安慰劑的數字較高，但統計上並無明顯差異。相較於調整haloperidol劑量治療的病患，olanzapine治療的病患有帕金森氏症候群、靜坐不能、肌張力不全的發生率較低。由於缺乏個別病患既有之急性和遲發性錐體外運動失調情況的詳細病史，目前尚無法證實olanzapine是否比較不會造成遲發性運動困難及/或其他遲發性錐體外症候群。

⁷當突然中斷使用olanzapine時，有急性症狀如出汗、失眠、顫抖、焦慮、噁心和嘔吐的報告。

⁸在為期12週的臨床試驗中，約30%泌乳素正常的病患以olanzapine治療後，血漿泌乳素濃度超過正常值上限。大部分的病患其上升的值通常為輕微的，且維持在正常值上限的2倍以下。

⁹由Olanzapine整合性資料庫中的臨床試驗所發現的不良事件。

¹⁰由Olanzapine整合性資料庫中的臨床試驗所測得的數值進行評估。

¹¹由自發性上市後報告所發現的不良事件，並用Olanzapine整合性資料庫取得發生頻率。

¹²由自發性上市後報告所發現的不良事件，並用Olanzapine整合性資料庫於95%信賴區間的上限估算發生頻率。

長期治療(至少48週)

產生不良反應、臨床顯著之變化(體重增加、血糖、總/低密度脂蛋白/高密度脂蛋白膽固醇或三酸甘油脂的升高)的病患百分比隨時間增加而增加；在完成9-12個月治療的成人病患中，平均血糖增加的速度在約6個月之後趨緩。

針對特殊族群之額外資訊

老年失智症病患之臨床試驗發現，相較於安慰劑組，olanzapine治療組的死亡率及腦血管方面不良反應的發生率較高(見警語和注意事項)。這類病患使用olanzapine很常見的副作用為步態異常和摔倒。肺炎，體溫升高，無力，起紅斑，視覺幻覺和尿失禁為常見。

於臨床研究中，帕金森氏症病患由藥物(dopamine作用劑)引發之精神疾病，其帕金森氏症惡化與產生幻覺報告很常見且發生次數也比安慰劑組多。

在研究雙極性疾患的臨床試驗中，併用olanzapine與valproate，嗜中性白血球減少症的發生率為4.1%，可能造成原因為valproate的血漿濃度高。當olanzapine與鋰鹽或valproate併用，常見的副作用($\geq 1/10$)包括顫抖、口乾、食慾增加及體重增加；也有發生言語障礙的報告(1/100-1/10)。在急性治療(為期6週)的臨床試驗中，olanzapine與鋰鹽或divalproex併用，相較於治療前的體重，有17.4%的病患體重增加 $\geq 7\%$ 。長期(為期12個月)以olanzapine預防雙極性疾患之復發，相較於治療前的體重，有39.9%的病患體重增加 $\geq 7\%$ 。

孩童族群

Olanzapine不適用於孩童和十八歲以下青少年。雖然尚未執行設計來比較成人和青少年的臨床試驗，青少年試驗所得的數據已和成人數據做比較。

下表彙整列出在青少年病患中(13-17歲)發生頻率高於成年病患的不良反應，或只有在青少年病患之短期試驗中發現到的不良反應。於相當的暴露量下，臨床上顯著的體重增加($\geq 7\%$)在青少年中發生頻率高於成人病患。相較於短期的臨床試驗，長期的臨床試驗(至少24週)中，青少年體重增加的幅度較高，有臨床顯著體重增加的人數百分比也較高。

在發生率分組中，不良反應依照嚴重程度遞減排列。表列之發生率的定義：很常見($\geq 1/10$)、常見($\geq 1/100$ 到 $< 1/10$)。

代謝與營養疾病
很常見：體重增加 ¹³ 、三酸甘油酯濃度上升 ¹⁴ 、食慾增加
常見：膽固醇濃度增加 ¹⁵
神經系統疾病
很常見：鎮靜(包括嗜睡hypersomnia、無力、嗜睡somnolence)
胃腸疾病
常見：口乾
肝膽疾病
很常見：肝轉胺酶(ALT、AST)濃度上升(見警語和注意事項)
研究報告
很常見：總膽紅素減少、GGT上升、血漿泌乳素濃度上升 ¹⁶

¹³短期治療後(中位作用期間22天)，與原體重(kg)相比，體重增加 $\geq 7\%$ 是很常見的(40.6%)；與原體重相比，體重增加 $\geq 15\%$ 則是常見的(7.1%)，體重增加 $\geq 25\%$ 是常見的(2.5%)；在長期用藥之下(至少24週)，與原體重相比，有89.4%的病患體重增加 $\geq 7\%$ ，55.3%的病患體重增加 $\geq 15\%$ ，及29.1%的病患體重增加 $\geq 25\%$ 。

¹⁴有觀察到從治療前空腹正常值(<1.016mmol/l)增加到高三酸甘油脂($\geq 1.467\text{mmol/l}$)及空腹三酸甘油脂從治療前邊緣範圍(≥ 1.016 至 $< 1.467\text{mmol/l}$)增加到高三酸甘油脂($\geq 1.467\text{mmol/l}$)。

¹⁵空腹總膽固醇從治療前空腹正常值(<4.39mmol/l)增加到高總膽固醇($\geq 5.17\text{mmol/l}$)是常見的。從治療前邊緣範圍(≥ 4.39 至 $< 5.17\text{mmol/l}$)增加到高總膽固醇($\geq 5.17\text{mmol/l}$)是很常見的。

¹⁶有7.4%青少年病患之血漿泌乳素濃度升高。

疑似不良反應之報告

已獲核准的藥物，其疑似不良反應的通報是重要的。藉此可持續檢測該藥物的效益與風險平衡。醫療照護專業人員需依照全國藥物不良反應通報系統之要求，通報任何疑似不良反應。

過量(依文獻記載)

徵兆和症狀

過量的常見症狀(>1/10發生率)包括心跳過快、精神激動/攻擊性、發音困難、各種錐體外症狀，和意識降低(程度從鎮靜到昏迷)。

其他醫學上過量的明顯後續現象包括妄想、痙攣、昏迷、疑似抗精神病藥物惡性症候群、呼吸抑制、肺部異物吸入、高血壓或低血壓、心律不整(<2%過量案例)和心肺停止。口服Olanzapine，有450毫克急性藥物過量導致死亡的案例，但是也有口服約2公克急性藥物過量存活的案例。

過量的處理

目前對olanzapine尚無特殊的解毒劑。不建議催吐。處理藥物過量的標準程序可能適用(即洗胃、給予活性碳)。併用活性碳顯示減少口服olanzapine的生體可用率達50%到60%。

根據病患臨床表現，應給予症狀治療和監測影響生命的器官功能，包括低血壓和呼吸衰竭的治療及支持呼吸功能。

不要使用epinephrine、dopamine、或其他交感神經的乙型受體作用劑，因為乙型受體受刺激可能加劇低血壓。必須監視心血管功能以偵測可能產生的心律不整。應持續嚴密醫療監督和監測直到病患復原。

藥理性質(依文獻記載)

藥效性質

藥物治療分類：精神抑制劑(psycholeptics)、diazepines、oxazepines、thiazepines與oxepines。ATC code為N05A H03。

藥效作用

Olanzapine為抗精神病、抗躁症及情緒穩定藥物，對一些受體系統有廣泛藥理作用。在臨床前試驗中，olanzapine表現出對多種受體具親和性(K_i: <100 nM)：serotonin 5-HT_{2A/2C}、5-HT₁、5-HT₅；dopamine D₁、D₂、D₃、D₄；D₅；cholinergic muscarinic M₁-M₅；α₁ adrenergic：histamine H₁受體。Olanzapine的動物行為試驗指出，其有5HT₁、dopamine及cholinergic之拮抗作用，與其受體結合的作用特性一致。在體外，olanzapine對serotonin 5HT₁受體的親和力較dopamine D₂受體強，且在體內，其5HT₁的活性比D₂的活性為強。於電生理研究中，顯示olanzapine選擇性降低mesolimbic (A10) dopaminergic神經細胞的觸發，但對有關運動功能的紋狀體(A9)神經傳導途徑幾乎沒有影響。Olanzapine在低於產生僵直反應(用以評估運動方面副作用的指標效果)的劑量時，會降低抗精神病作用的試驗指標狀態下的制約逃避反應(avoidance response)。與其他許多抗精神病藥品的效果不同是，Olanzapine在一項“抗焦慮”的試驗中，增加反應能力。

在一個以健康受試者為對象的單一口服劑量(10毫克)正子放射斷層影像學試驗(PET)中，olanzapine對serotonin 5-HT₁受體結合力較dopamine D₂高。在另一單光子電腦斷層攝影(SPECT)研究中，結果顯示對於olanzapine治療有效的思覺失調病患，相較於對其他抗精神病藥物及對risperidone治療有效的病患，有較低的紋狀體D₂結合程度，但與對clozapine治療有效的病患相較，則程度相當。

臨床療效

在2個安慰劑對照的試驗，及以三個其他抗精神病藥作為對照的2個試驗中，測試2,900位以上患有正性與負性症狀的思覺失調症病患，結果顯示olanzapine不只使正性症狀達到具統計意義的改善，亦使負性症狀達到具統計意義的改善。

在一項多國、雙盲的思覺失調症、情感分裂症及其他相關疾病之比較性研究中，包括1481位伴隨有不同程度相關憂鬱症狀(Montgomery-Asberg憂鬱評量指數在治療前平均分數為16.6)，一項前瞻性次級分析結果顯示，治療後之情緒分數變化，olanzapine的治療效果(-6.0)優於haloperidol (-3.1)(p=0.001)。

在治療躁症或混合性雙極性疾患的臨床試驗中，結果顯示olanzapine對於長達三週以上之躁症症狀緩解，優於安慰劑及valproate semisodium (divalproex)。在為期6週與12週的臨床試驗中，結果亦顯示 olanzapine 對於躁症與震盪症之症狀減輕，相當於 haloperidol 。

Olanzapine 10mg併用於鋰鹽或valproate治療至少2週，對於躁症症狀之緩解，優於鋰鹽或valproate單獨治療6週。

在一為期12個月預防復發的試驗中，躁症病患使用olanzapine治療獲改善後再隨機給予olanzapine或安慰劑。統計上顯示，在預防雙極性疾患復發之主要治療目標上，olanzapine顯著優於安慰劑。在預防躁症復發或預防震盪症復發上，olanzapine在統計上亦顯著優於安慰劑。

在另一為期12個月預防復發的試驗，躁症病患接受olanzapine合併鋰鹽治療獲改善後再隨機單獨給予olanzapine或鋰鹽。在預防躁症復發之主要治療目標上，統計上顯示olanzapine未遜於鋰鹽(olanzapine 30.0%，鋰鹽38.3%; p=0.055)。

在一個為期18個月合併治療的試驗中，躁症或混合性雙極性疾患病使用olanzapine加上情緒穩定劑(鋰鹽或valproate)；長期以olanzapine合併鋰鹽或valproate治療，在延遲雙極性疾患之復發上(依特定之症狀診斷條件來定義)，統計上並未顯著優於單獨給予鋰鹽或valproate。

孩童族群

青少年(13到17歲)的療效對照資料僅限於在思覺失調症(六週)及第一型雙極性疾患躁症(三週)之短期試驗，青少年人數少於200人。

olanzapine的使用劑量是有彈性的，由2.5毫克開始治療，劑量可調高至20毫克/天的範圍，服用olanzapine的青少年體重增加明顯大於成年人；空腹總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇、三酸甘油脂及泌乳素改變的程度也大於成年人。目前尚未有維持療效的對照資料或長期安全性的資料(請見警語和注意事項及副作用)。長期安全性的資料主要局限於開放式(open-label)非對照試驗數據。

藥動性質(依文獻記載)

吸收

口服後olanzapine極易吸收，於5至8小時間達到血漿最高濃度，其吸收不受食物影響。相較於靜脈注射給予，其口服絕對生體可用率仍未知。

分佈

血中濃度約介於7-1000ng/ml時，olanzapine的血漿蛋白質結合率約為93%。Olanzapine主要是與血清白蛋白及α1-酸醣蛋白(α1-acid-glycoprotein)結合。

生物轉化

Olanzapine在肝臟藉由接合作用與氧化途徑代謝。血液循環中的主要代謝物為10-N-glucuronide，不會通過血腦屏障。Cytochrome P450-CYP1A2及P450-CYP2D6，則將此藥轉變成帶有N-desmethyl基與2-hydroxymethyl基的代謝物。在動物試驗中，這兩種代謝物的體內藥理活性遠小於olanzapine原型的活性。故抗精神病的藥理作用，主要來自於olanzapine本身。

排除

口服後，olanzapine在健康受試者的平均末期排除半衰期，因年齡和性別而有所差異。健康老年受試者(65歲以上)相較於非老年受試者，其平均排除半衰期較長(51.8小時相較於33.8小時)，且消除率較低(17.5公升/小時相較於18.2公升/小時)。於老年病患身上觀察到的藥物參數變化程度，並未超出非老年受試者的範圍。44位65歲以上老年思覺失調症者，給予劑量5-20毫克/天，並未出現任何明顯不良反應。

相較於男性受試者，女性受試者的平均排除半衰期較長(36.7小時相較於32.3小時)，且消除率較低(18.9公升/小時相較於27.3公升/小時)。然而olanzapine(5-20毫克)在女性受試者(467人)顯示出與男性受試者(869人)相當的安全性。

腎功能不全

腎功能不全的病患(肌酸酐清除率<10ml/min)相較於健康受試者，其平均排除半衰期(37.7小時相較於32.4小時)或消除率(21.2公升/小時相較於25.0公升/小時)皆沒有明顯差異。質量平衡的研究中、放射性標記的olanzapine，約有57%(主要為olanzapine代謝物)自尿中排除。

吸烟

腎功能不全的病患(肌酸酐清除率<10ml/min)相較於健康受試者，其平均排除半衰期延長(39.3小時)，且消除率降低(18.0公升/小時)，類似於不吸煙的健康受試者(48.8小時及14.1公升/小時)。

不吸煙病患相較於吸煙受試者(男性和女性)，其平均排除半衰期較長(38.6小時相較於30.4小時)，且消除率較低(18.6公升/小時相較於27.7公升/小時)。

Olanzapine的血漿清除率在老年受試者低於年輕受試者，女性低於男性，非吸煙者低於吸煙者。然而，年齡、性別、或吸煙狀況影響olanzapine的清除率和半衰期的程度，相較於病患間個體差異的程度為小。

在一百白種人、日本人和中國人的研究調查中，發現olanzapine的藥動性質在三個種族間，並無任何差別。

孩童族群

青少年(13到17歲)：olanzapine的藥動力學在成人和青少年中是