

PIC/S GMP 藥品

衛部藥製字第058105號 GMP G-12118

“得生”

水楊酸甲酯藥膠布10%

Methyl Salicylate Plaster 10% “T.S.”

暫時緩解

頸部僵硬、肩膀痠痛、關節炎
背痛、拉傷、瘀傷、扭傷

枚入
(10cm×14cm/片)
建議售價： 元

藥商、製造廠：得生製藥股份有限公司三廠 TEH SENG PHARMACEUTICAL MFG. CO., LTD. THIRD FACTORY



請由此撕開

“得生” 水楊酸甲酯藥膠布10% Methyl Salicylate Plaster 10% “T.S.”

【特點】 “得生” 水楊酸甲酯藥膠布10%能促進皮膚筋骨的止痛效果更具有清涼感的貼布

【成分】

有效成分及含量：Each Patch, 2.0g plaster (excluding fabric and film)
(10cm×14cm) contains：

L-Menthol.....60mg
Methyl Salicylate.....200mg

其他成分(賦形劑)：Adhesive Plaster 7019

【用途(適應症)】 頸部僵硬、肩膀痠痛、關節炎、背痛、拉傷、瘀傷、扭傷之疼痛緩解。

【不得使用族群】 對本藥成分過敏者(包含藥品成分與賦形劑成分)。

【用法用量】

次數	患部每次使用一片，同一患部一天請勿使用超過兩片。每天最多使用不超過三片。 最久請在八小時之後撕下貼布，請勿連續使用超過五天。
方式	●請清潔並乾燥患部，撕去背面膠膜貼於患部。 ●兒童使用時請在監督者的監督下使用，三歲以下請勿使用。

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品。

【諮詢專線】 080000668



批 號：
保存期限：

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：
 - 對本藥成分過敏者(包含藥品成分與賦形劑成分)
- 有下列情形者，請洽醫師診治：
 - 深部皮膚組織感染
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師或藥師、藥劑生：
 - 曾對藥品或化妝品有過敏症狀(皮膚起疹子、紅斑、瘙癢等)。
 - 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - 2歲以下之兒童。
- 其他使用上注意事項：
 - 本產品僅供外用。
 - 以下情況請勿使用：
 1. 傷口或皮膚有破損者。
 2. 請勿與熱敷墊一起使用。
 3. 請勿同時使用多種同類型之疼痛藥膏藥膠布。
 - 使用此產品時，
 1. 敬請遵照說明指示。
 2. 避免接觸眼睛、黏膜或皮疹。
 - 請放置在兒童無法取得的地方。如不慎誤食，請立即尋求醫療協助。
 - 避免陽光直射。
 - 勿超過建議使用量。

【警語】

- 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。
 - 發疹、發癢或對皮膚過度刺激的情況。
- 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治。
 - 情況惡化。
 - 症狀持續超過五天以上。
 - 症狀一度減緩卻於數天內再度復發。

【包裝】 2.0g (膏體重)(10cm×14cm) /片×(1-10)片/鋁箔袋裝。

【儲存條件】 避免陽光直射，請保存於30°C以下。

藥商、製造廠：
得生製藥股份有限公司三廠
地 址：台南市永康區環工路63號

拉
鏈