

美獲平 膜衣錠 500 毫克

Metfopin F. C. Tablets 500 mg

【藥理分類】

口服降血糖藥物。

Metformin須由醫師處方，它是用來治療糖尿病。這種疾病的特色是高血糖，即血中出現過高的糖份。當血糖值超出某一種程度時尿液也會出現糖份。

糖尿病有二種情形：

※最常見的一型是需要以口服藥物治療（口服降血糖劑）。

※另一型是需要注射胰島素。

注射胰島素與口服糖尿病藥物彼此是無法互換的，所以，對患者作醫學方面上的檢驗以確定糖尿病的類型是有必要的。

注意：糖尿病患者的飲食需嚴格遵照醫師的建議。

【成 分】

Each F.C. tablet contains:

Metformin HCl 500 mg

賦形劑：

Avicel、Povidone、Aerosil Light、Magnesium Stearate、HPMC、
Titanium Dioxide、P.E.G. 6000

【適應症】

糖尿病。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

—腎絲球體過濾率（eGFR）介於30-45ml/min/1.73m²應減量使用。

—Metformin速效劑型之每日最高治療劑量為3GM。

—80歲以上老年病人不建議開始使用metformin治療。

—Metformin用於治療80歲以下之老年患者時，應特別謹慎。

用量

每8小時服用1錠(500mg)，或每12小時服用850mg，餐間或餐後服用。每日最大劑量3g，分數次服用。

投與方式

口服

療程

本品請務必每日服用，除非有醫師特別指示，否則請勿中斷服藥。

【禁忌】

腎絲球體過濾率（eGFR）小於30 ml/min/1.73 m²禁用。

不得給予有以下情況的病患：

※已知對metformin hydrochloride過敏的患者。

※腎臟功能不全者（肌酸酐值升高的中度腎臟功能損壞）。

※發燒的感染性疾病（如呼吸道感染、泌尿道感染）。

※持續性的腹瀉、嚴重的嘔吐。

※接受手術的前後兩天。

※接受血管碘化物顯影劑注射，進行放射性診斷前後（如靜脈尿路攝影、血管放射線攝影），須在腎臟功能恢復正常後才能繼續接受metformin治療。

※嚴重且不穩定的糖尿病（酮酸中毒）。

※心臟衰竭、呼吸機能不全。

※肝臟機能不全（肝功能受損）。

※喝入過量酒精性飲料。

※懷孕及授乳婦女。

※若有任何問題，請諮詢醫師或藥師。

【警語】

Metformin有導致代謝性酸中毒(例如：乳酸中毒)之風險，醫療人員宜提醒病患該不良反應，倘若出現代謝性酸中毒之不良反應，應立即停藥並回診開立處方之醫師。

在治療期間可能會出現嘔吐、伴有肌肉痙攣的腹痛，全身疲勞，這是糖尿病已出現嚴重不穩定的現象（糖尿病酮酸中毒或乳酸中毒），這需要特殊治療，請立即停藥請教醫師。

【注意事項】

• 靜脈注射顯影劑有導致急性腎功能下降之危險，因此醫師為病患注射顯影劑應先停用metformin，且需確認病患術後之腎功能恢復正常，才能再開始使用該藥品。

• 醫師為病患處方metformin時，需定期監測其腎功能。

醫師會定期安排患者作臨床上的檢驗，測定血中creatinine濃度

以檢查腎臟功能。因為口服糖尿病藥物大體上都是經由腎臟排除，故，每日宜攝入至少1.5公升液體。

有些疾病或藥物如corticosteroids、口服避孕藥、部分的利尿劑等，可能會造成較嚴重或稍微嚴重的糖尿病不穩定，這時需暫時以胰島素來治療。如患者正在接受其他治療，或遭受到病毒感染如：流行性感冒、呼吸道感染或泌尿道感染時；請務必告知醫生。

如患者即將接受碘化物顯影劑的放射性診斷如：靜脈尿路攝影或血管放射線攝影，醫師將要求患者在接受該項攝影之前及攝影進行中停止metformin的服用。唯當確定腎功能已完全正常時才能恢復metformin的使用。

若患者是在住院中接受臨床診斷、手術或是併發症的治療如：心臟疾病，請務必讓醫師知道您正在接受metformin的治療。

避免過度攝入酒精性飲料。

若有任何問題，請立即請教醫師或藥師。

【交互作用】

為避免有些藥物、利尿劑、口服避孕藥或酒精之間可能產生的交互作用，患者應告知醫師或藥師目前所接受藥物治療的情形。

【孕婦與授乳婦】

懷孕期間糖尿病的治療應以胰島素為主。

服用metformin期間若發現已懷孕，應以胰島素來取代metformin。請告知醫師懷孕事實，以便在治療上作些必要性改變。如欲作懷孕的打算，也請告知醫師。原則上，如果已懷孕或正處於授乳期，在服用藥物前應先將該情形告知醫師或藥師。

【對駕車與操作機器之反應】

單獨使用metformin並不會出現低血糖現象，因此，服用metformin後開車或操作機器不會有特別的危險性。

【副作用】

有些患者在服藥或多或少會有不舒服的反應。

於治療之初，特別是服藥並非在用餐時較可能會出現胃腸方面的不適（噁心、嘔吐、腹瀉）。這種現象通常是暫時性的。會持續約10天，只要在用餐時或飯後服用metformin該副作用會減少。如果這種症狀仍然持續著，請停藥並儘速告知醫師。

嘔吐、伴有肌肉痙攣的腹痛、嚴重性疲勞與全身性身體不適，這些可能是因為糖尿病（糖尿病性酮酸中毒或乳酸中毒）已出現嚴重不穩定的現象。這時需要特殊治療。若有此現象者，請立即停藥並請教醫師。

若出現本仿單未記載之不良反應時請告知醫師。

【忘記服藥處理】

請依照原有服藥時間服藥。但勿將劑量加倍。

【儲存條件】

25°C以下儲存，遠離小孩伸手可及之處。

【包裝】

6~1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

委託者：新瑞生物科技股份有限公司

台南市新市區中山路182號

製造廠：瑞士藥廠股份有限公司新市廠

台南市新市區中山路182號

