

健催新 糖衣錠 2.5 毫克(因達拍邁)
Jatrisyn S.C. Tablets 2.5mg (Indapamide)

衛部藥製字第 058341 號

GMP G-12350

「成份」

每錠含 Indapamide Hemihydrate 2.5mg

「臨床藥理」

Jatrisyn 是一種非 Thiazide 類的 Sulfonamide 利尿劑，具有一個 indoline 環，Jatrisyn 之降壓作用機制至今仍尚未完全明瞭，可能包括對腎臟及腎臟外之效應。在低於有效利尿劑量下，Jatrisyn 即可產生良好的降血壓作用，因此其降壓效應與降低末梢血管阻力有關。Jatrisyn 係作用於遠側腎小管抑制水分及電解質的再吸收而達到利尿作用。

「適應症」

高血壓

「用法用量」

本藥須由醫師處方使用。

成人初劑量為 1.25mg，每日一次於早晨服用。經四週後若降壓效果不理想，可增為 2.5mg，每日服用一次，再經四週若降壓效果仍不理想，可增至 5mg，每日服用一次，且可考慮併用其他降壓劑。

「注意事項」：

1. 禁忌症：無尿症，對本藥成分及其他 Sulfonamide 衍生物過敏者。

2. 警告：

- (1) 曾有患者服用 Indapamide 後引發低血鈉及低血鉀之報告，且大多發生於老年婦女。此外，使用利尿劑時最常引起低血鉀。
- (2) 應監測血鉀濃度，尤其是易有低血鉀危害者如心律不整或以毛地黃治療的心臟疾病患者，老年人或有 hyperaldosteronism 的病人。
- (3) 利尿劑不應與鋰鹽併用，因併用會減少鋰鹽自尿液的排出量，而增加鋰鹽中毒的危險。

3. 一般注意：

- (1) 痛風的患者於治療期間，應監測血中尿酸濃度。
- (2) 如同其它 Thiazide 利尿劑，Jatrisyn 可能會使腎病者氮血症的症狀更為惡化。若患者於投藥期間出現腎功能惡化之現象時，應考慮暫時停藥，此外，建議患者於治療期間應定期檢查腎臟功能。
- (3) 肝病患者應謹慎投與，以免因干擾體液與電解質的平衡而造成肝昏迷現象。
- (4) 服用本藥可能會使潛在性糖尿病的症狀明顯化及增加對 Insulin 的需求量。治療期間應定期檢查血糖濃度。
- (5) Jatrisyn 可能會降低體內鈣之排除，長期投與可能會造成血鈣過高或血磷酸鹽過少。
- (6) Thiazide 利尿劑可能會使全身性紅斑狼瘡患者的症狀更為惡化。

(7) 孕婦授乳婦之投與：

FDA 孕婦用藥分級:B 級。

動物實驗並沒有致畸胎作用，但因為動物實驗有時無法充份反應出人類可能的反應，因此，應權衡利弊後再行使用。授乳：Jatrisyn 是否會分泌至乳汁中尚未知，因為大多數的藥物會分泌至乳汁中，因此，服用本藥時應停止授乳。

4. 過量：

Jatrisyn 過量時所表現的症狀與利尿作用有關，包括：電解質不平衡，低血壓及肌肉無力等。治療方式為症狀療法，調整電解質的異常並考慮採取洗胃或催吐。

「副作用」：

服用 Jatrisyn 可能發生低血鉀，頭痛、眩暈、疲倦、肌肉痙攣、噁心、食慾不佳、腹瀉、便祕、消化不良及皮下疹。下列症狀則極少發生：姿勢性低血壓、心悸、肝臟酵素增加，血液惡質（包括血小板缺少症）、低血鈉、代謝性鹼中毒、高血壓、血中尿酸濃度升高、感覺異常、多形性紅斑、表皮潰瘍、光敏感、性無能、腎功能不全及可逆性的急性近視，在高血壓的建議劑量下 Jatrisyn 對血漿中三酰甘油脂、低密度脂蛋白膽固醇或低密度脂蛋白膽固醇的比例沒有影響。不論是糖尿病人或非糖尿病人，本藥對於葡萄糖耐受性並沒有顯著的影響。

「儲存」請儲存於 30°C 以下

「包裝」：2~1000錠塑膠瓶裝，PTP 鋁箔盒裝。

「賦形劑」

Corn Starch、Lactose、Polyvinyl Pyrrolidone K30 (PVPK-30)、Colloidal Silicon Dioxide (Aerosil200#)

Magnesium Stearate、Lactose S.G、Sodium Starch Glycolate (Primojel)、Hypromellose606 (HPMC606)

Polyethylene Glycol6000 (Macrogol6000)、Gelatin、Acacia Powder (Gum Arabic)、Calcium Carbonate

Sucrose、Talc、Erythrosine (Food Red No.7) Titanium Dioxide (TiO2)、Wax220

委託者：



興南實業股份有限公司

台北市大湖街 131 巷 2 弄 6 號 1 樓

製造廠：



優生製藥廠股份有限公司

台中市工業區工業 21 路 14 號