

優麗痕凝膠®

成份

Each gm contains:

Escin	10mg
Heparinoid	10mg
Diethylamine Salicylate	50mg



賦形劑

Alcohol、Carbopol 940、Ethylene D.T.A. disod.、Glycerin 95%、Methyl paraben、Tween 20、Neroli oil、Lavender oil、Cremophor RH 60、Butyl hydroxytoluene、Triethanolamine、Water purified。

優麗痕凝膠主成份Escin (Content of triterpene glycosides : 90~110%) 為馬栗種子萃取物(Horse Chestnut Seed Extract)，是一種酸性 Triterpene saponin的結晶體，具有保護及振奮微血管微循環的特性；Heparinoid (Activity not less than 80 IU/mg) 為動物器官抽取物，具有軟化組織及抗凝血作用。

作用方式

優麗痕凝膠是一種含酒精之製劑，它的三重作用是來自於它的三種成分： Escin 以一種易於滲透入皮膚的形式(吸收性Escin)擊敗組織水腫，減低血管滲透性和預防組織內水的存積；局部性水腫引起的沉重和壓力感可以被去除。

Heparinoid 有類似肝素的作用，能改善血液循環，抑制凝固作用，與 Escin合併有抗發炎作用，且同時激發結締組織的再生。

水楊酸二乙胺(Diethylamine Salicylate)能增強抗發炎作用，且對去除深部疼痛有效。

適應症

慢性靜脈功能不全之輔助改善及創傷後之疼痛緩解。

副作用

可能產生皮膚過敏反應。



用法用量

本藥須由醫師處方使用。

塗一薄層於皮膚受害部位，一天一次或多次，此藥不必按摩使滲入皮膚內，但如想這麼做的話也可以，當處理潰瘍時，僅適於塗擦在潰瘍周圍的皮膚上。

保存條件

儲存於 30°C 以下，藥品應置於小孩不易取得處。在有效期間內使用。

包裝：

1000 公克以下鋁管裝。

製造廠：中國化學製藥股份有限公司 新豐廠：新竹縣新豐鄉坑子口182-1號®
委託者(藥商)：侑安藥品有限公司 ☎ 07-793-2839 FAX: 07-793-3069
地址：高雄市小港區孔鳳路455 巷12-1號 洽詢時間 9:00 ~ 17:00 (公定假日除外)

