

LVT850 1.0

衛部藥製字第058523號PIC/S GMP G-12425

衛部藥廠證字第(AP)0433067號

適用藥害救濟制度



"國嘉" 瀉糖素錠 850毫克

Lvtangsu Tablets 850mg "Kojar"

【成分】每錠中含：
Metformin HCl.....850mg

【賦形劑】
Hydropropyl Cellulose-L、Povidone、Magnesium Stearate、Sodium Starch Glycolate。

【適應症】
糖尿病。

【說明】
作為飲食治療失效的輔助治療。本品為Biguanide類之口服降血糖藥物，用於非胰島素依賴型【或第二類型或成人型】糖尿病，有時也可適用於因缺乏胰島素所引起的糖尿病。體重過重的第二類型糖尿病在飲食療法失效後，以metformin作為第一線用藥，經證實可降低糖尿病併發症。

【用法用量】本藥須由醫師處方使用。
本品服用劑量多寡將視患者臨床檢測出的血糖值而定。通常，每日服用二次，每次服用一錠。於用餐時或餐後服用。
1. Metformin之每日大劑量「速效劑型：3000mg」。
2. 80歲以上老年病人不建議開始使用Metformin治療。
3. Metformin用於治療80歲以下之老年患者時，應特別謹慎。
4. 腎絲球體過濾率(eGFR)介於30-45ml/min/1.73m²應減量使用。

【使用禁忌】依文獻記載：

本藥品不能給予有下列情況的患者：

- 已知會對metformin hydrochloride或本藥品的任一成份過敏者。
- 糖尿病情呈現嚴重不穩定性(酮酸中毒)。
- 腎臟功能不全，即使是血中肌氨酸酐(creatinine)增加的中度腎功能不全。
- 感染性疾病(呼吸道感染、泌尿道感染)。
- 二天內接受碘化物顯影劑的放射性診斷檢查(例如：靜脈尿路攝影、血管放射線攝影)。
- 心臟衰竭、呼吸功能不全。
- 肝臟功能不全(肝功能受損)。
- 持續性腹瀉、反覆性嘔吐。
- 攝入過量酒精性飲料。
- 處於授乳期的婦女。
- 腎功能不全患者，腎絲球體過濾率(eGFR)小於30ml/1.73 m²禁用。

【警語】依文獻記載：

1. 在治療期間可能會出現嘔吐、伴有肌肉痙攣的腹痛、嚴重性疲勞與全身不適，這些是因為糖尿病情已出現嚴重不穩定(糖尿性酮酸中毒或乳酸中毒)，需特別治療。若有此現象者，請立即停藥並請教醫師。
2. Metformin有導致代謝性酸中毒(例如：乳酸中毒)之風險，醫療人員宜提醒病患該不良反應，倘若出現代謝性酸中毒之不良反應，應立即停藥並回診開立處方之醫師。

【注意事項】依文獻記載：

1. 醫師會安排患者定期接受臨床上的檢驗，測定血中肌氨酸酐(creatinine)濃度、以檢查腎臟功能。這種檢查是正確的，因為，口服糖尿病藥物主要是經由腎臟排除。
2. 有些疾病或藥物(corticosteroids、某些利尿劑、ritodrine、salbutamol、terbutaline與ACE抑制劑)可能會造成糖尿病情出現嚴重不穩定。患者應該讓醫師明瞭是否有正在接受其他治療或出現感染性疾病如：流行性感冒、呼吸道感染或泌尿道感染。如患者即將接受碘化物顯影劑的放射性診斷，如：靜脈尿路攝影或血管放射線攝影，醫師將會要求患者在接受項攝影檢查之前、進行中以及結束後的48小時內均停止本藥品的服用。在確定腎功能已恢復正常後才能再次使用本藥品。倘若患者因接受臨床診斷、外科手術或是其他因素之需而住院，請務必讓醫師知道您正在接受本藥品的治療。避免飲用酒精性飲料。

- 3.靜脈注射顯影劑有導致急性腎功能下降之危險，因此醫師為病患注射顯影劑應先停用Metformin，且需確認病患術後腎功能恢復正常，才能開始使用該藥品。
- 4.醫師為病患處方Metformin時，需定期監測其腎功能。

【孕婦及授乳婦】依文獻記載：

懷孕期間糖尿病的治療應以胰島素為主。
患者在服用本藥品期間一旦發現已懷孕，就會改以胰島素治療；患者應告知醫師懷孕事實，醫師才能在治療上作些必要性的改變。患者如有懷孕的打算，也應讓醫師明瞭。本品是禁止使用於授乳期的患者。原則上，如果已懷孕或正處於授乳期間，在服用藥物前應先將實情告知醫師。

【對駕車與操作機器之反應】依文獻記載：

單獨使用本藥品並不會出現低血糖現象，因此，服用本品開車或操作機器並不會有特別的危險性。然而，與其他降血糖藥物(如：sulphonylurea、降低血糖藥物、胰島素、repaglinide)同時使用時，留意低血糖的出現、及對血糖濃度的影響是很重要的。

【藥物間交互作用】依文獻記載：

患者若目前或最近曾服用其他藥物，如：corticosteroids、ACE(angiotensin-converting enzyme)抑制劑類的降血壓藥物、利尿劑、ritodrine、salbutamol或terbutaline、碘化物顯影劑或含酒精性的藥物，甚至指示藥，均應告知醫師或藥師。

【副作用】依文獻記載：

如同其他藥物，本藥品也會造成一些不良反應。
於治療之初，特別是服藥時間並非在用餐時，較易有胃腸方面的不適(噁心、嘔吐、腹瀉)。這些症狀通常是暫時性的，大約會持續10天，只要在用餐時或飯後服用本藥品便會降低副作用的發生。如果症狀仍然持續著，請停藥並儘速告知醫師。
治療期間出現嘔吐、伴有肌痙攣的腹痛、嚴重性疲勞與全身性身體不適、有可能是因為糖尿病病情已出現嚴重的不穩定(糖尿病性酮酸中毒或乳酸中毒)，需給予特別治療。若有此情形者，應立即停藥並請教醫師。
若出現本仿單未記載之不良反應時，請告知醫師或藥師。

【服用藥物的時間與頻率】依文獻記載：

本藥品請於用餐時或飯後服用。請整錠吞服，不要咀嚼。例如：每日服用劑量是二錠，早餐服用一錠，晚餐再服用一錠。在任何情況下，均須遵守醫師處方的規定。

【療程】依文獻記載：

本藥品請務必每日服用，除非醫師有特別指示，否則請勿中斷服藥。

【忘記服藥的處理】依文獻記載：

將忘記服用的劑量略過，然後在下一個服藥時間再服用下一個劑量。但勿將劑量加倍。萬一服用的藥錠已超出服用的劑量，請立即諮詢醫師或藥師。

【儲存】

請保存於25°C下之乾燥環境。
本品請置於孩童不可及處。

【包裝】

4~1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。



國嘉製藥工業股份有限公司 幼獅三廠
KOJAR PHARMA TAICHUNG YOUTH PLANT 3

臺中市大甲區日南里工十路2號
服務專線：(04)26816197