# 外盒、仿單、標籤粘貼表

| 產品名稱 | 龍杏速樂利痛感冒液 | 申請廠商 | 龍杏生技製藥股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 衛生署給證號碼 | 衛部藥製 字 第 058951 號 | | |

106. 5. 16

**主成分**

本品每ml中含有

Chlorpheniramine Maleate .....0.12mg

DL-Methylephedrine HCl .....0.495mg

Caffeine.....1.5mg

Acetaminophen.....15mg

Guaiacol Glyceryl Ether .....2.49mg




LA-PS08-60-1

製造批號：

保存期限：

**用法**

通常成人每次10ml，5-7歲每次3ml，3-4歲每次2ml，2歲每次1.5ml，一日三次，每餐飯後及有必要時就寢前加服一次。醫師藥師藥劑生指示藥品。

**用途(適應症)**

緩解感冒之各種症狀（流鼻水、鼻塞、噴嚏、咯痰、咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛）。

衛部藥製字第058951號




非比林系綜合感冒製劑　　衛部藥製字第058951號

# "龍杏" 速樂利痛 感冒液 Surariton Solution "L.S."

PIC/S GMP

作用：本劑係以治療鼻塞、打噴嚏、流鼻水之Chlorpheniramine Maleate治療咳嗽、咯痰之DL-Methylephedrine HCl和Guaiacol Glyceryl Ether、治療解熱、鎮痛之Acetaminophen及治療頭痛之Caffeine等各種藥品配合而成，因各成分之配合能夠發揮藥理學之相乘作用，使其對於因感冒引起之各種症狀能夠迅速發揮緩解之效果，且本品因製成液劑而吸收快，服用後即能迅速發揮效果，且因副作用極少，男女老幼均宜於服用之。

有效成分及含量：(每5mL中含有)

| | |
|---|---|
| Chlorpheniramine Maleate | 0.12mg |
| Caffeine | 1.5mg |
| Guaiacol Glyceryl Ether | 2.49mg |
| DL-Methylephedrine HCl | 0.495mg |
| Acetaminophen | 15 mg |

其他成分(賦形劑)：Sucrose、Caramel、Cassia Oil、Sodium Dehydroacetate、Glycyrrhiza Extract、Tween 20、Citric Acid、Purified Water

用途(適應症)：緩解感冒之各種症狀（流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咯痰、咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛）。

**使用上注意事項：**

一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一) 12歲以下。

(二) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。

(三) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病（如慢性氣管炎或肺氣腫）所引起之持續或慢性咳嗽的人。

(四) 有呼吸疾病的人：如慢性氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。

(三) 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

(四) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。

四、其他使用上注意事項：

(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。

(二) 避免陽光直射。

(三) 勿超過建議使用量。

(四) 使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。

(五) 不要服用本藥超過七日。

(六) 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。

(七) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen(

有急性肝衰竭的風險。

(八) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險機械。

(九) 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起

奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及

可長期使用。

用法用量：

| 適用對象 | 用法 | 用量 |
|---|---|---|
| 成人 | 一日三次，每餐飯後及有必要時就寢前加服一次。 | 一次10 mL |
| 5-7歲 | | 一次3 mL |
| 3-4歲 | | 一次2 mL |
| 2歲 | | 一次1.5 mL |

警語：

一、服用(使用)本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用

諮詢醫師藥師藥劑生：

| 身體部位 | 副作用 |
|---|---|
| 皮膚 | 發疹、發紅 |
| 消化器官 | 噁心、嘔吐、食慾不振 |
| 神經系統 | 頭暈、耳鳴 |
| 其他 | 喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊 |

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接

(一) 若有任何不適情況產生。

(二) 咳嗽持續達一星期以上、或有高燒、厭疲、疹子或持

(三) 症狀沒有改善、或症狀選併有發燒、或發燒持續三日

(四) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔

(五) 服用過量[每日超過Acetaminophen 4,000毫克(mg)]，

列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗

(六) 有過敏情形，例如：腫、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、

他皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。


包裝：10-4000ml玻璃瓶裝

儲存條件：25℃以下

類別：醫師藥師藥劑生指示藥品

製造廠：龍杏生技製藥股份有限公司

地址：台南市佳里區嘉福里115之1號



註 (1)報核仿單標籤以粘貼全型實物爲原則。
(2)仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。

106. 5. 16

