

“長安”

感冒熱飲 顆粒

(甜橙口味)

Ganmon Hot remedy Granules “C.A.”

台灣空氣品質日趨惡化，以致於人體呼吸系統：鼻喉部、呼吸道、氣管、肺部等防禦能力越來越脆弱，再加上流行性感冒的病毒抗藥性日趨增強，不論是大人或是抵抗力較弱的小孩及老人，一旦感染往往不容易痊癒且容易再度感染。

感冒熱飲顆粒係一種感冒製劑，沒有藥味，有淡淡的水果香，用溫水沖泡後，熱熱的喝，能幫助發汗，紓解感冒及受風寒時所引起的鼻塞、頭痛、咽喉痛、四肢酸痛、發燒、畏寒等不適症狀，同時讓身體感到溫暖舒適。

【成分】Each gm Contains:

有效成分及含量：

Acetaminophen	150 mg
Caffeine Anhydrous	25 mg
Chlorpheniramine Maleate	1.25 mg
DL-methylephedrine hydrochloride	5 mg

其他成份(賦形劑)：Lactose Monohydrate, Mannitol, Sodium Saccharin, Sodium Cyclamate, Stevia, Glycyrrhiza Trisodium, Hydrophobic silicon dioxide, Riboflavine, Malic acid, Tartrazine, Carboxymethylcellulose Calcium, Polyvinylpyrrolidone, Alcohol, Orange Flavour.

【用途(適應症)】緩解感冒之各種症狀(發燒、畏寒、頭痛、咽喉痛、流鼻涕、鼻塞、打噴嚏、關節痛、肌肉酸痛)。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 - (一)曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，請洽醫師診治：
 - (一)12歲以下。
 - (二)吸菸、慢性阻塞性肺疾病(患)，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者。
 - (三)有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
 - (四)有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難及青光眼的人，因前列腺肥大引起排尿困難的人。
 - (五)有心臟病及65歲以上的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑師：
 - (一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (二)正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
 - (三)同時服用含 Acetaminophen 成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
 - (四)服用鎮靜藥或安眠藥的人。
- 四、其他使用上注意事項
 - (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (二)避免陽光直射。
 - (三)勿超過建議劑使用量。
 - (四)不要服用本藥超過七日。
 - (五)服用過量的 Acetaminophen 可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 Acetaminophen 成分的藥品，但是每天服用 Acetaminophen 超過 4,000 毫克(mg)會發生肝臟損害。
 - (六)酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為 Acetaminophen (Paracetamol) 有急性肝衰竭的風險。
 - (七)可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
 - (八)不得與酒精性飲料併用。
 - (九)避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心悸過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】將一包感冒熱飲倒入一般杯子或馬克杯中，慢慢加入半杯溫開水，攪拌均勻後，再依個人喜好加入冷水或溫開水至 150c. c. (一般紙杯八分滿)熱熱的立即服用。

年齡	劑量
成人及 12 歲以上	一日 3 次，飯後服用。每次 1 包(2 公克)。

警語：

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑師：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一)若有任何不適情況產生。
- (二)咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
- (三)症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
- (四)喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
- (五)服用過量[每日超過 Acetaminophen 4,000 毫克(mg)]，或服藥後出現下列症狀：胃腸不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
- (六)有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】2 公克/鋁箔包，6 ~ 500 包盒裝

【儲存條件】25°C 以下避光儲存。

【類別】醫師藥劑師指示藥品。

衛部藥製字第 059876 號

長安化學工業股份有限公司

彰化縣福興鄉萬豐村福工路 19 號、19-1 號