

衛部藥製字第059893號
G-13151

“得生”治痠痛貼布5%

Jhjh Suan Tong Patch 5% “T.S.”

暫時緩解局部疼痛

Bar Code

片裝(10cm×14cm)

請沿此線剪開



開封後請輕壓拉鍊，密封保存



“得生”治痠痛貼布5% Jhjh Suan Tong Patch 5% “T.S.”

特點：

本藥是具清涼感的藥布，適用於暫時緩解局部疼痛。

成分：

有效成分及含量：

Each gm Contains：L-Menthol.....0.05g

其他成分(賦形劑)：

Purified Water、Glycerin、PVA Solution、Sorbitol Solution、Sodium Polyacrylate、Nikasol TS-620、Kaolin、Sodium Carboxymethyl Cellulose、Alcohol、Sodium Polyacrylate Starch、Tween 80、Titanium Dioxide、Nonion OP-80R、Isopropyl Myristate、Aerosil 200、Methylparaben、Propylparaben、Tartaric Acid

用途(適應症)：

暫時緩解局部疼痛。

使用上注意事項

- 有下列情形者，請勿使用：
 - 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - 濕疹、癢疹、有傷口或皮膚有破損的人。
 - 12歲以下。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - 曾對藥物、化妝品等有過敏症狀者(例如：發疹、潮紅、搔癢、癢疹等)。
- 其他使用上注意事項：
 - 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - 避免陽光直射。
 - 勿超過建議使用量。
 - 本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜。
 - 本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)或皮膚深部感染。
 - 使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。

用法用量

次數	1.成人及12歲以上兒童依患部需要使用，但每日不可超過3-4片。 2.12歲以下兒童，使用前請洽醫師診治。
方式	請清潔並乾燥患部，撕去保護膠膜貼於患部。

警語

■ 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
皮膚	有過敏症狀，例如：發疹、潮紅、搔癢、癢疹。

■ 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治。
若有任何不適情況發生。自覺狀況沒有改善或更惡化。經治療後，若症狀沒有改善或症狀有改善，但停藥後病情又復發。

包裝：14.4g(膏體重)(10cmx14cm)/片x1或5片鋁塑複合袋裝
20.56g(膏體重)(10cmx20cm)/片x1或5片鋁塑複合袋裝

不得使用族群：

曾因本藥成分引起過敏的人

(包含藥品成分與賦形劑成分)。

類別：醫師藥師藥劑生指示藥品。

貯存：

避免日光直射，保存於30°C以下。

一袋五片裝之本藥，請於14天內使用完畢。

諮詢專線：0800-000658

衛部藥製字第059893號GMP G-13151

委託者：惠生藥粧有限公司

地址：台南市永康區環工路63號4樓

製造廠：得生製藥股份有限公司二廠

地址：台南市永康區環工路42-1號



製造批號：

保存期限：